

令和6年度 播磨灘広域共同調査（6月24日調査） 徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (℃)	塩分	透明度 (m)	DO (mg/L)	細胞/mL								
							シャットネラ 区分不能	シャットネラ アンティーカ	シャットネラ マリーナ	シャットネラ オーバータ	シャットネラ グロボーサ	カレニア ミキモトイ	コクロディニウム ポリクリコイデス	アレキサンドリウム sp.	ディノフィシス ロツンダータ
T4	07:22	0-5			7.0		-	-	-	-	-	-	0.14	0.02	
		0	20.17	31.77		7.0									
		1	20.16	31.77		7.0	-	-	-	-	0.02	-	-	0.14	-
		5	20.10	31.77		6.9	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-
		10	20.08	31.80		6.9	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02
		15	19.93	31.81		6.7									
		20	19.85	31.85		6.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		25	19.79	31.87		6.6									
		30	19.75	31.88		6.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B-1	19.59	31.90		6.5	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-
T1	07:53	0-5			10.5		0.04	-	-	-	-	-	0.12	0.04	
		0	21.63	31.02		7.8									
		1	21.63	31.01		7.8	-	-	-	-	-	-	0.02	-	
		5	21.37	31.25		7.7	-	-	-	-	0.02	-	-	0.04	0.06
		10	20.53	31.52		7.6	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-
		15	20.02	31.67		7.6									
		20	20.01	31.95		7.0									
		25	19.76	31.98		6.7									
		30	19.21	31.97		6.1									
		B-1	17.93	32.03		4.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
St.4	08:07	0-5			5.7		0.04	-	-	-	-	-	-	-	
		0	21.44	31.15		7.7	0.09	-	-	-	0.01	-	-	0.04	-
		1	21.39	31.19		7.7	0.10	-	-	-	-	-	-	-	
		5	21.23	31.18		7.7	-	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01
		10	20.54	31.41		7.4	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-
		15	19.77	31.66		6.8									
		20	19.74	31.67		6.8	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02
		25	19.20	31.89		7.0									
		30	19.02	31.93		6.6	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
		35	18.23	31.95		5.2									
		B-1	18.19	31.95		5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

播磨灘

◎ T4

◎ T1

◎ St.4

大栗田
折浦野


淡路島

・有害種のシャットネラ属(区分不能、グロボーサ)が検出されましたが、僅かでした。

・麻痺性貝毒原因種を含むアレキサンドリウム属が検出されましたが、僅かでした。

珪藻は、前回調査時より増加しました。

珪藻細胞数
St.4(0-5m): 51 cells/ml
T4(0-5m) : 73 cells/ml



・有害種のシャットネラ属(区分不能、グロボーサ)が検出されましたが、僅かでした。

・麻痺性貝毒原因種を含むアレキサンドリウム属が検出されましたが、僅かでした。

珪藻は、前回調査時より増加しました。

珪藻細胞数
St.4(0-5m): 51 cells/ml
T4(0-5m) : 73 cells/ml