


令和6年度 ウチノ海環境調査（4月22日調査） 徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (°C)	塩分	透明度 (m)	DO (mg/L)	細胞/L	細胞/mL
							コシノディスカス ワイレシー	ユーカンピア ゾディアクス
1	9:09	0-5			6.0		-	0.29
		0	14.25	31.82		8.9		
		1	14.09	31.80		8.9		
		5	14.00	31.84		8.9		
		10	13.99	31.91		8.8		
		B-1	13.99	31.91		8.8		
2	9:16	0-5			8.6		-	0.26
		0	14.67	31.98		8.8		
		1	14.11	31.88		8.8		
		5	13.84	32.18		8.7		
		B-1	13.80	32.22		8.5		
3'	9:23	0-5			9.7		-	-
		0	14.75	32.03		8.8	-	-
		1	14.65	31.98		8.8	-	0.08
		5	14.06	32.09		8.9	-	0.10
		10						
		B-1	13.82	32.16		8.6	-	-
4	9:32	0-5			9.2		-	-
		0	14.65	32.05		8.8		
		1	14.43	32.07		8.8		
		5	13.93	32.11		8.7		
		10	13.72	32.24		8.6		
		B-1	13.76	32.22		8.5		
5	9:39	0-5			9.2		-	-
		0	15.28	31.97		8.7		
		1	14.76	31.99		8.8	-	-
		5	14.22	32.13		8.9	-	-
		10	13.71	32.25		8.6	-	0.38
		B-1	13.66	32.26		8.4		
6	9:48	0-5			11.2		-	-
		0	15.33	32.00		8.7		
		1	14.85	31.94		8.7		
		5	14.30	32.13		8.8		
		10	13.64	32.26		8.3		
		B-1	13.64	32.26		7.9		



備 考

・藻類の色落ちさせる珪藻のユーカンピアゾディアクスが検出されましたが、低密度でした。

・珪藻はキートセロス属主体で前回調査時に比べやや減少しました。

珪藻細胞密度 : 21 cells/ml (St.5 0-5m)