


令和6年度 ウチノ海環境調査（5月7日調査）徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (°C)	塩分	透明度 (m)	DO (mg/L)	細胞/L	細胞/mL
							コシノディスカス ワイレシー	ユーカンピア ゾディアクス
1	09:31	0-5			6.5		-	0.14
		0	15.83	31.98		8.1		
		1	15.78	32.00		8.1		
		5	15.57	31.98		8.0		
		10	14.65	32.08		7.8		
		B-1	14.61	32.08		7.8		
2	09:35	0-5			7.4		-	-
		0	16.20	31.98		8.1		
		1	15.98	31.97		8.2		
		5	15.29	32.01		8.1		
		B-1	14.96	32.04		8.0		
3'	09:41	0-5			11.6		-	0.33
		0	16.08	32.05		8.1	-	0.02
		1	15.91	32.03		8.1	-	-
		5	15.68	32.06		8.1	-	0.19
		10	15.29	32.10		8.0		
		B-1	15.06	32.03		8.0	-	0.01
4	09:52	0-5			7.4		-	-
		0	15.91	32.09		8.0		
		1	15.86	32.05		8.0		
		5	15.51	32.07		8.0		
		10	15.19	32.10		8.0		
		B-1	15.22	32.11		8.0		
5	10:01	0-5			7.7		-	0.15
		0	16.06	32.04		8.0		
		1	16.00	32.05		8.0	-	0.22
		5	15.73	32.07		8.1	-	0.05
		10	15.05	32.13		7.5	-	-
		B-1	15.08	32.12		7.6		
6	10:09	0-5			8.1		-	0.31
		0	15.96	32.03		8.1		
		1	15.96	32.03		8.1		
		5	15.69	32.06		8.0		
		10	15.30	32.14		7.9		
		B-1	15.26	32.13		7.8		



備考

・藻類を色落ちさせる珪藻のユーカンピア ゾディアクスが検出されましたが、ごく僅かでした。

・珪藻は前回調査時から減少しました。
珪藻細胞密度 : 0 cells/ml (St.5 0-5m)