


令和6年度 ウチノ海環境調査 (6月5日調査) 徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (°C)	塩分	透明度 (m)	DO (mg/L)	細胞/mL				
							シャットネラ 区分不能	シャットネラ オバータ	シャットネラ グロボーサ	カレニア ミキモトイ	コクロディニウム ポリクリコイデス
1	09:27	0-5			8.5		-	-	0.01	-	-
		0	19.50	31.42		7.9					
		1	19.41	31.38		7.9					
		5	19.08	31.56		7.8					
		10	18.85	31.65		7.6					
		B-1	18.87	31.63		7.7					
2	09:33	0-5			7.0		-	-	0.03	-	-
		0	19.91	31.59		8.1					
		1	19.81	31.54		8.1					
		5	18.70	31.74		7.9					
		B-1	18.60	31.76		7.4					
3'	09:40	0-5			8.1		-	-	0.02	-	-
		0	19.97	31.53		8.2	-	-	0.02	-	-
		1	19.67	31.55		8.2	-	-	0.02	-	-
		5	19.21	31.63		8.3	-	-	0.03	-	-
		10	18.60	31.76		7.5					
		B-1	18.60	31.77		7.5	-	-	-	-	-
4	09:48	0-5			8.9		-	-	0.02	-	-
		0	19.73	31.65		8.1					
		1	19.13	31.71		8.0					
		5	18.99	31.71		7.8					
		10	18.83	31.74		7.7					
		B-1	18.83	31.74		7.7					
5	09:56	0-5			9.4		-	-	0.02	-	-
		0	20.17	31.51		8.2					
		1	20.16	31.50		8.1	-	0.01	0.03	-	-
		5	18.82	31.71		8.2	-	-	0.03	-	-
		10	18.33	31.88		5.9	-	-	-	-	-
		B-1	18.36	31.85		7.1					
6	10:06	0-5			10.5		-	-	-	-	-
		0	20.54	31.52		8.2					
		1	20.50	31.51		8.1					
		5	19.16	31.61		8.2					
		10	18.38	31.82		7.9					
		B-1	18.40	31.82		7.9					



備考

- ・有害種のシャットネラ属(オバータ、グロボーサ)、が検出されましたが、ごく僅かでした。
- ・珪藻は前回調査時から減少しました。
珪藻細胞密度 : 3 cells/ml (St.5 0-5m)