


令和6年度 ウチノ海環境調査（6月17日調査）徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (℃)	塩分	透明度 (m)	DO (mg/L)	細胞/mL						
							シャットネラ アンティーカ	シャットネラ マリーナ	シャットネラ 区分不能	シャットネラ オーバータ	シャットネラ グロボーサ	カレニア ミキモトイ	コクロディニウム ポリクリコイデス
1	08:59	0-5			8.0		-	-	-	-	0.01	-	-
		0	22.50	31.63		7.7							
		1	22.25	31.51		7.8							
		5	21.61	31.49		7.8							
		10	20.68	31.59		7.6							
		B-1	20.77	31.59		7.5							
2	09:05	0-5			7.5		-	-	-	-	0.01	-	-
		0	22.25	31.59		7.8							
		1	21.09	31.62		7.9							
		5	20.14	31.78		7.8							
		B-1	19.87	31.82		7.2							
3'	09:12	0-5			7.3		-	-	-	-	0.01	-	-
		0	22.39	31.57		7.8	-	-	-	-	-	-	-
		1	21.83	31.33		7.8	-	-	-	-	0.01	-	-
		5	20.02	31.81		7.4	-	-	-	-	-	-	-
		10	19.82	31.82		7.1							
		B-1	19.80	31.82		7.0	-	-	-	-	-	-	-
4	09:22	0-5			7.9		-	-	-	-	-	-	-
		0	21.18	31.72		7.4							
		1	20.94	31.71		7.4							
		5	20.35	31.81		7.4							
		10	20.08	31.88		7.1							
		B-1	20.04	31.86		7.1							
5	09:30	0-5			8.5		-	-	0.01	-	0.01	-	-
		0	22.24	31.56		7.8							
		1	21.31	31.55		7.8	-	-	0.01	-	-	-	-
		5	20.23	31.76		8.1	-	-	-	0.01	-	-	-
		10	19.85	31.82		7.3	-	-	-	0.01	-	-	-
		B-1	19.79	31.83		7.2							
6	09:41	0-5			10.5		-	-	-	-	0.03	-	-
		0	22.00	31.61		7.8							
		1	21.64	31.62		7.8							
		5	20.34	31.73		8.0							
		10	19.60	31.80		7.6							
		B-1	19.48	31.80		6.8							



備 考

・有害種のシャットネラ属(区分不能、グロボーサ)が検出されましたが、ごく僅かでした。

・珪藻は属主体で前回調査時から減少しました。
珪藻細胞密度 : 0 cells/ml (St.5 0-5m)