


令和6年度 ウチノ海有害プランクトン調査（6月26日調査） 徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (°C)	塩分	透明度 (m)	DO (mg/L)	細胞/mL						
							シャットネラ アンティーカ	シャットネラ マリーナ	シャットネラ 区分不能	シャットネラ オバータ	シャットネラ グロボーサ	カレニア ミキモトイ	コクロディニウム ポリクリコイデス
1	08:49	0-5			6.7		-	-	-	-	-	-	-
		0	20.47	31.46		7.0							
		1	20.44	31.44		7.0							
		5	20.45	31.47		7.0							
		10	20.44	31.47		7.0							
		B-1	20.44	31.48		6.9							
2	08:56	0-5			5.8		-	-	-	-	0.01	-	-
		0	20.98	31.43		7.3							
		1	20.92	31.44		7.3							
		5	20.56	31.61		6.8							
		B-1	20.47	31.64		6.0							
3'	09:03	0-5			6.0		-	-	0.02	-	0.02	-	-
		0	21.19	31.42		7.5	-	-	0.01	-	0.01	-	-
		1	20.91	31.41		7.5	-	-	0.01	-	0.03	-	-
		5	20.66	31.57		7.2	-	-	-	-	0.01	-	-
		10	20.41	31.69		6.3							
		B-1	20.40	31.69		6.2	-	-	-	-	-	-	-
4	09:11	0-5			5.7		-	-	-	-	0.01	-	-
		0	21.27	31.36		7.6							
		1	20.83	31.50		7.5							
		5	20.64	31.59		7.1							
		10	20.47	31.66		6.6							
		B-1	20.38	31.71		6.2							
5	09:19	0-5			6.5		-	-	0.01	-	-	-	-
		0	21.37	31.33		7.5							
		1	21.24	31.34		7.5	-	-	-	-	-	-	-
		5	20.77	31.50		7.3	-	-	-	-	-	-	-
		10	20.42	31.69		6.1	-	-	-	-	-	-	-
		B-1	20.39	31.69		5.9							
6	09:27	0-5			7.2		-	-	-	-	-	-	-
		0	21.55	31.37		7.5							
		1	21.34	31.32		7.6							
		5	20.80	31.48		7.2							
		10	20.42	31.72		5.7							
		B-1	20.35	31.75		5.5							



備 考

・有害種のシャットネラ属(区分不能、グロボーサ)が検出されましたがごく僅かでした。

・珪藻はキートセロス属主体で前回調査時から増加しました。

珪藻細胞密度 : 264 cells/ml (St.5 0-5m)