


令和6年度 ウチノ海環境調査（7月4日調査） 徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (°C)	塩分	透明度 (m)	DO (mg/L)	細胞/mL						
							シャットネラ アンティーカ	シャットネラ マリーナ	シャットネラ 区分不能	シャットネラ オバータ	シャットネラ グロボーサ	カレニア ミキモトイ	コクロディニウム ポリクリコイデス
1	08:59	0-5			5.5		-	-	-	0.04	0.17	-	-
		0	23.42	31.25		7.9							
		1	23.05	31.06		8.0							
		5	21.62	31.42		7.4							
		10	21.26	31.47		6.5							
		B-1	21.26	31.47		6.5							
2	09:05	0-5			5.2		-	-	0.04	0.02	0.09	-	-
		0	23.74	31.11		7.8							
		1	23.08	30.97		8.0							
		5	21.48	31.57		7.3							
		B-1	21.32	31.57		6.7							
3'	09:11	0-5			5.5		-	-	0.11	0.06	0.05	-	-
		0	24.12	31.07		7.8	-	-	0.33	0.09	0.15	-	-
		1	23.23	31.13		7.9	-	-	0.30	0.07	0.16	-	-
		5	21.78	31.45		7.7	-	-	0.05	0.03	0.16	-	-
		10	21.08	31.66		5.7							
		B-1	21.07	31.66		5.7	-	-	-	-	-	-	-
4	09:19	0-5			5.2		-	-	-	-	0.04	-	-
		0	22.40	31.32		7.5							
		1	22.21	31.39		7.4							
		5	21.67	31.52		7.1							
		10	21.51	31.59		6.9							
		B-1	21.38	31.60		6.7							
5	09:26	0-5			5.5		-	-	0.08	0.03	0.15	-	-
		0	22.87	31.18		7.7							
		1	22.20	31.28		7.7	-	-	0.03	-	0.08	-	-
		5	21.36	31.58		7.3	-	-	-	-	-	-	-
		10	20.74	31.78		4.8	-	-	-	-	-	-	-
		B-1	20.82	31.76		5.0							
6	09:35	0-5			5.6		-	-	-	0.01	0.04	-	-
		0	22.75	31.24		7.6							
		1	22.04	31.32		7.8							
		5	21.51	31.56		7.8							
		10	21.00	31.72		6.7							
		B-1	20.99	31.71		6.6							



備 考

- ・有害種のシャットネラ属(区分不能、オバータ、グロボーサ)が検出されましたが低密度でした。
- ・珪藻は、スケルトネマ属主体で前回調査時から減少しました。
珪藻細胞密度 : 115 cells/ml (St.5 0-5m)