


令和6年度 ウチノ海有害プランクトン調査（7月10日調査） 徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (°C)	塩分	透明度 (m)	DO (mg/L)	細胞/mL						
							シャットネラ アンティーカ	シャットネラ マリーナ	シャットネラ 区分不能	シャットネラ オバータ	シャットネラ グロボーサ	カレニア ミキモトイ	コクロディニウム ポリクリコイデス
1	08:57	0-5			6.2		-	-	0.04	0.05	0.31	-	-
		0	22.34	31.10		6.5							
		1	22.28	31.11		6.5							
		5	22.28	31.14		6.5							
		10	22.18	31.19		6.4							
		B-1	22.17	31.19		6.4							
2	09:02	0-5			6.2		-	-	0.03	-	0.14	0.01	-
		0	25.11	31.10		7.4							
		1	25.08	31.09		7.4							
		5	23.04	31.28		7.3							
		B-1	22.70	31.35		7.5							
3'	09:09	0-5			6.5		-	-	0.01	-	0.09	-	-
		0	23.73	31.10		7.5	-	-	0.01	0.03	0.09	-	-
		1	23.72	31.10		7.5	-	-	0.05	0.09	0.74	-	0.02
		5	23.46	31.17		7.5	-	-	0.05	0.10	1.04	0.01	-
		10	22.68	31.36		7.3							
		B-1	22.32	31.40		6.5	-	-	0.01	0.05	0.26	-	-
4	09:17	0-5			8.5		-	-	0.10	0.08	0.54	-	-
		0	24.22	31.15		7.5							
		1	23.84	31.15		7.5							
		5	23.15	31.30		7.0							
		10	22.69	31.36		6.9							
		B-1	22.54	31.39		6.6							
5	09:25	0-5			6.1		-	-	0.05	0.06	0.73	-	-
		0	23.94	31.10		7.4							
		1	23.97	31.12		7.4	-	-	0.05	0.03	0.31	-	-
		5	22.83	31.32		7.5	-	-	-	-	0.03	-	-
		10	22.47	31.41		6.4	-	-	0.01	0.01	0.11	-	-
		B-1	22.39	31.40		6.3							
6	09:33	0-5			7.0		-	-	-	0.01	0.02	-	-
		0	24.03	31.13		7.4							
		1	23.68	31.10		7.4							
		5	22.75	31.35		7.9							
		10	22.41	31.39		6.6							
		B-1	21.93	31.49		6.1							



備 考

・有害種のシャットネラ属(区分不能、オバータ、グロボーサ)、カレニア ミキモトイ、コクロディニウム ポリクリコイデスが検出されましたが低密度でした。

・珪藻はキートセロス属主体で前回調査時と同程度でした。
珪藻細胞密度 : 118 cells/ml (St.5 0-5m)