


令和6年度 橘湾・椿泊湾 有害プランクトン調査（5月10日調査） 徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (°C)	塩分	透明度 (m)	細胞/L	細胞/mL
						コシノディスカス ワイレシー	ユーカンピア ゾディアクス
1	09:36	0-5			4.8	-	0.54
		0	16.54	30.03		-	0.04
		1	16.80	31.46			
		5	16.57	31.82			
		10	16.36	32.29			
		B-1	16.36	32.29			
2	09:27	0-5			4.2	-	-
		0	17.58	27.10			
		1	17.43	31.43			
		5	16.71	31.94			
		B-1	16.69	31.99			
3	09:18	0-5			3.8	-	0.31
		0	17.71	30.84		-	-
		1	17.40	31.45			
		5	17.02	31.88			
		B-1	16.98	31.96			
3'	09:09	0-5			4.0	-	0.05
		0	17.61	30.88			
		1	17.51	31.24			
		5	17.04	31.83			
		B-1	16.37	32.11			
4	09:00	0-5			3.7	10	0.05
		0	17.28	30.95			
		1	17.35	31.22			
		5	16.95	31.78			
		10	16.41	31.92			
		15	16.34	32.50			
		B-1	16.38	32.57			



橘湾

椿泊湾

備 考

・珪藻は橘湾、椿泊湾ともにシュードニッチア属主体で、前回調査から増加しました。

珪藻細胞数 橘湾St.1(0-5m): 200cells/ml
椿泊湾St.3(0-5m): 203cells/ml

令和6年度 橘湾・椿泊湾 有害プランクトン調査（5月10日調査） 徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (°C)	塩分	透明度 (m)	細胞/mL		備 考
						コシノディスカス ワイレシー	ユーカンピア ゾディアクス	
1	08:22	0-5			6.9	-	0.01	
		0	16.91	31.08				
		1	16.80	31.59				
		5	16.47	32.10				
		B-1	16.42	32.23				
2	08:28	0-5			6.7	-	0.02	
		0	16.34	29.37		-	-	
		1	16.80	30.86				
		5	16.51	32.04				
		10	16.41	32.24				
		15	16.39	32.55				
		B-1	16.39	32.55				
3	08:35	0-5			5.5	-	0.06	
		0	16.31	30.11				
		1	16.43	31.09				
		5	16.51	31.85				
		10	16.44	32.18				
		15	16.37	32.37				
		B-1	16.40	32.49				
4	08:46	0-5			9.3	-	0.08	
		0	15.96	30.73				
		1	16.00	31.03				
		5	16.10	31.57				
		10	16.44	32.12				
		15	16.39	32.39				
		20	16.43	32.49				
		B-1	16.44	32.53				