


令和6年度 橘湾、椿泊湾 有害プランクトン調査（6月11日調査） 徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (°C)	塩分	透明度 (m)	細胞/mL			
						シャットネラ アンティーカ	シャットネラ マリーナ	シャットネラ 区分不能	シャットネラ オーバータ
1	09:18	0-5			5.9	-	-	-	-
		0	20.33	31.47		-	-	-	-
		1	20.27	31.75					
		5	19.47	32.44					
		10	18.96	32.90					
		B-1	18.97	32.89					
2	09:11	0-5			5.1	-	-	-	-
		0	21.64	29.66					
		1	20.38	31.25					
		5	19.24	32.46					
		B-1	19.22	32.52					
3	09:03	0-5			5.2	-	-	-	-
		0	21.11	0.11		-	-	-	-
		1	20.86	31.59					
		5	20.34	32.12					
		B-1	20.09	32.25					
3'	08:57	0-5			4.8	-	-	-	-
		0	21.08	31.32					
		1	20.89	31.70					
		5	20.39	32.27					
		B-1	19.47	32.63					
4	08:48	0-5			6.0	-	-	-	-
		0	20.99	31.69					
		1	20.55	31.83					
		5	19.77	32.33					
		10	19.04	32.73					
		15	18.88	33.05					
		B-1	18.76	33.00					



備考

・珪藻は橘湾、椿泊湾ともにキートセロス属
主体で前回調査から減少しました。

珪藻細胞数 橘湾St.1(0-5m): 58 cells/ml
椿泊湾St.3(0-5m): 62 cells/ml

令和6年度 橘湾・椿泊湾 有害プランクトン調査（6月11日調査） 徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (°C)	塩分	透明度 (m)	細胞/mL				備 考
						シャットネラ アンティーカ	シャットネラ マリーナ	シャットネラ 区分不能	シャットネラ オバータ	
1	08:17	0-5			5.2	-	-	-	-	
		0	20.40	31.37						
		1	19.76	31.90						
		5	19.04	32.66						
		B-1	18.97	32.80						
2	08:22	0-5			7.0	-	-	-	-	
		0	20.02	31.68		-	-	-	-	
		1	19.60	32.00						
		5	19.07	32.75						
		10	19.40	33.12						
		15	19.02	33.09						
		B-1	18.86	33.06						
3	08:28	0-5			8.8	-	-	-	-	
		0	19.97	31.64						
		1	19.58	32.03						
		5	19.20	32.71						
		10	19.37	33.15						
		15	19.17	33.17						
		B-1	18.84	33.18						
4	08:36	0-5			7.5	-	-	-	-	
		0	20.06	31.35						
		1	19.82	31.79						
		5	19.72	32.08						
		10	19.29	32.96						
		15	19.09	33.18						
		20	18.98	33.27						
		B-1	19.03	33.31						