

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (℃)	塩分	透明度 (m)	細胞/mL						
						シャットネラ アンディーカ	シャットネラ マリーナ	シャットネラ 区分不能	シャットネラ オバータ	シャットネラ グローボサ	カレニア ミキモイ	コクロディニウム ポリクリコイデス
1	09:10	0-5			4.0	-	-	-	-	0.05	0.01	-
		0	26.30	30.31		-	-	-	-	-		
		1	25.44	30.83								
		5	23.51	31.74								
		10	21.70	32.16								
		B-1	21.55	32.26								
2	09:03	0-5			3.3	-	-	-	-	-	-	-
		0	27.04	29.53								
		1	25.25	30.96								
		5	23.80	31.46								
		B-1	22.59	31.87								
3	08:55	0-5			5.1	-	-	-	-	-	-	-
		0	27.34	30.48		-	-	-	-	-		
		1	26.67	30.79								
		5	24.25	31.69								
		B-1	23.88	31.74								
3'	08:50	0-5			5.1	-	-	-	-	-	-	-
		0	26.86	30.61								
		1	25.94	30.99								
		5	24.03	31.80								
		B-1	23.27	31.90								
4	08:40	0-5			7.1	-	-	-	-	0.04	-	-
		0	26.10	30.85								
		1	25.23	31.29								
		5	23.67	31.81								
		10	22.28	32.07								
		15	21.41	32.38								
		B-1	21.32	32.42								

備 考

- ・有害種のシャットネラ グローボサが検出されましたが、ごく僅かでした。
- ・有害種のカレニア ミキモイが検出されましたが、ごく僅かでした。
- ・珪藻は橋湾、椿泊湾ともにスケルトナマ属主体で、前回調査から増加しました。

珪藻細胞数
橋湾St.1(0-5m): 1,072 cells/ml
椿泊湾St.3(0-5m): 554 cells/ml

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (℃)	塩分	透明度 (m)	細胞/mL							備 考	
						シャットネラ アンディーカ	シャットネラ マリーナ	シャットネラ 区分不能	シャットネラ オバータ	シャットネラ グロボーサ	カレニア ミキモトイ	コクロディニウム ポリクリコイデス		
1	08:11	0-5			5.2	-	-	-	-	0.04	-	-		
		0	25.80	30.84										
		1	24.84	31.34										
		5	23.45	31.62										
		B-1	22.71	31.78										
2	08:16	0-5			6.1	-	-	-	-	0.03	-	-		
		0	25.62	31.13		-	-	-	0.02	-	-			
		1	24.80	31.33										
		5	23.00	31.78										
		10	22.01	32.01										
		15	21.39	32.30										
		B-1	21.36	32.36										
3	08:21	0-5			6.7	-	-	-	-	0.02	-	-		
		0	25.45	31.16										
		1	24.18	31.49										
		5	22.59	31.99										
		10	21.73	32.06										
		15	21.35	32.46										
4	08:27	0-5			9.0	-	-	-	-	0.04	-	-		
		0	25.42	31.27										
		1	24.36	31.57										
		5	22.50	32.03										
		10	21.64	32.32										
		15	21.22	32.73										
		20	21.05	32.92										
		B-1	21.02	33.09										