


令和6年度 北灘 環境調査（4月4日調査）徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (°C)	塩分	透明度 (m)	DO (mg/L)	細胞/L	細胞/mL	
							コシノディスカス ワイレシー	ユーカンピア ゾディアクス	
2	09:58	0-5			12.4			-	
		0	12.22	32.33		9.1			
		1	12.20	32.29		9.1		-	
		5	12.17	32.31		9.1		-	
		10	12.15	32.38		9.1		0.91	
		15	12.07	32.41		9.1			
		20	11.98	32.47		9.0			
		B-1	11.99	32.47		9.0	20	0.42	
4	09:12	0-5			13.0			-	0.08
		0	12.03	32.31		9.1		-	-
		1	11.98	32.24		9.1		-	-
		5	11.93	32.27		9.1		-	0.36
		10	11.99	32.36		9.0		-	0.12
		15	11.90	32.42		9.1			
		20	10.86	32.55		9.0		-	0.70
		25	10.63	32.58		8.9			
		30	10.50	32.61		8.8		-	0.19
		35	10.51	32.62		8.6			
		40	10.51	32.63		8.5			
		B-1	10.51	32.64		8.4	20	4.32	
5	10:35	0-5			12.9			-	0.09
		0	12.04	32.31		9.1			
		1	11.99	32.30		9.1		-	-
		5	11.97	32.31		9.1		-	-
		10	11.95	32.36		9.0		-	-
		15	11.97	32.37		9.0			
		20	11.92	32.41		9.0			
		25	11.84	32.40		9.0			
		30	10.98	32.47		8.8			
		B-1	10.70	20.26		7.5		-	2.81

備 考

・藻類を色落ちさせる珪藻であるユーカンピア ゾディアクスが検出されましたが、低密度でした。

・珪藻は、前回調査時より減少しました。
珪藻細胞数 St.4(0-5m):4cells/ml