


令和6年度 北灘 環境調査 (5月15日調査) 徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (°C)	塩分	透明度 (m)	DO (mg/L)	細胞/L		細胞/mL	
							コシノディスカス ワイレシー	ユーカンピア ゾディアクス	シャットネラ 区分不能	
2	09:58	0-5			10.1		-	1.36	-	
		0	17.13	31.69		8.4				
		1	16.82	31.71		8.4	-	-		
		5	16.42	31.70		8.4	30	0.53		
		10	15.93	31.71		8.5	-	1.50	0.01	
		15	15.84	31.78		8.4				
		20	15.62	31.85		8.0				
		B-1	15.28	31.99		7.5	-	0.66	-	
4	09:13	0-5			10.4		-	0.68	-	
		0	16.82	31.68		8.2	10	1.00		
		1	16.81	31.66		8.3	-	0.76		
		5	16.23	31.69		8.4	-	0.22		
		10	15.94	31.76		8.4	-	0.71		
		15	15.83	31.83		8.3				
		20	15.57	31.90		8.0	-	0.69	-	
		25	15.00	32.15		7.7				
		30	14.85	32.23		7.6	-	0.63	-	
		35	14.88	32.26		7.6				
		40	14.59	32.27		7.4				
		B-1	14.55	32.27		7.4	-	0.83	-	
5	10:23	0-5			10.3		-	0.47	-	
		0	16.81	31.75		8.4				
		1	16.41	31.72		8.4	-	0.23	-	
		5	16.21	31.74		8.4	-	0.60	-	
		10	15.81	31.79		8.2	-	2.08	-	
		15	15.79	31.80		8.2				
		20	15.62	31.86		8.1				
		25	15.05	32.10		7.7				
		30	14.81	32.21		7.6				
B-1	14.66	32.22	7.5	-	1.26	-				



備考

- ・有害種のシャットネラ属(区分不能)が検出されましたが、ごく僅かでした。
- ・珪藻はキートセロス属主体で、前回調査時より増加しました。
珪藻細胞数 St.4(0-5m): 35 cells/ml