令和6年度　北灘　環境調査　（5月30日調査）　徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層（m）	水温（℃）	塩分	透明度（m）	DO（mg/L）	細胞/mL			
							シャットネラ区分不能	シャットネラオバータ	カレニアミキモトイ	コクロディニウムポリクリコイデス
2	09:43	0-5			8.0		−	−	−	−
		0	18.71	31.11		8.3				
		1	18.73	31.17		8.3	−	−	−	−
		5	18.85	31.26		8.3	−	−	−	−
		10	18.35	31.43		8.1	−	−	−	−
		15	18.19	31.49		8.0				
		20	17.75	31.71		7.7				
		B-1	17.51	31.78		7.4	−	−	−	−
4	09:22	0-5			8.0		−	−	−	−
		0	18.86	30.95		8.3	−	−	−	−
		1	18.85	30.95		8.3	−	−	−	−
		5	18.44	31.33		8.2	−	−	−	−
		10	18.31	31.44		8.1	−	−	−	−
		15	18.17	31.58		8.0				
		20	17.98	31.60		8.0	−	−	−	−
		25	17.80	31.70		7.8				
		30	17.06	31.90		7.5	−	−	−	−
		35	16.10	32.11		7.0				
		40	16.05	32.10		6.9				
		B-1	16.05	32.10		6.9	−	−	−	−
5	10:12	0-5			9.0		−	−	−	−
		0	18.38	31.13		8.2				
		1	18.41	31.28		8.2	−	−	−	−
		5	18.41	31.34		8.2	−	−	−	−
		10	18.43	31.49		8.2	−	−	−	−
		15	18.17	31.63		8.0				
		20	18.00	31.63		7.9				
		25	17.98	31.63		7.9				
		30	17.48	31.83		7.8				
		B-1	16.18	32.11		7.1	−	−	−	−



備　考

・有害種は検出されませんでした。

・珪藻は、前回調査時より減少しました。
珪藻細胞数　St.4(0-5m)：26 cells/ml