


令和6年度 北灘 環境調査（6月6日調査）徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (℃)	塩分	透明度 (m)	DO (mg/L)	細胞/mL				
							シャットネラ 区分不能	シャットネラ オーバータ	シャットネラ グロボーサ	カレニア ミキモトイ	コクロディニウム ポリクリコイデス
2	09:36	0-5			15.9		-	-	0.06	-	-
		0	20.81	31.23		8.1					
		1	20.60	31.22		8.1	-	-	0.01	-	-
		5	19.62	31.24		8.0	-	-	0.04	-	-
		10	19.12	31.30		8.2	-	-	0.03	-	-
		15	18.58	31.37		7.5					
		20	18.16	31.64		7.1					
		B-1	17.00	31.97		6.0	-	-	-	-	-
4	09:04	0-5			14.5		-	-	0.03	-	-
		0	20.16	31.25		8.1	-	-	0.04	-	-
		1	20.12	31.21		7.9	-	-	0.01	-	-
		5	19.66	31.22		7.7	-	-	0.01	-	-
		10	19.06	31.27		7.9	-	-	0.08	-	-
		15	18.58	31.46		7.5					
		20	18.57	31.66		7.6	-	-	0.01	-	-
		25	17.43	31.84		6.6					
		30	17.12	32.09		7.1	-	-	-	-	-
		35	16.61	32.17		6.1					
		40	16.53	32.18		6.0					
		B-1	16.53	32.18		6.0	-	-	-	-	-
5	10:07	0-5			11.8		-	-	0.01	-	-
		0	20.08	31.28		7.8					
		1	19.93	31.26		7.8	-	-	0.01	-	-
		5	19.44	31.30		7.7	-	-	0.02	-	-
		10	19.04	31.34		8.2	-	-	0.02	-	-
		15	18.90	31.58		8.0					
		20	18.71	31.63		7.8					
		25	17.63	31.81		6.8					
		30	17.30	32.01		7.1					
		B-1	16.65	32.17		6.2	-	-	-	-	-



備 考

・有害種のシャットネラ グロボーサが検出されましたが、ごく僅かでした。

・珪藻は、前回調査時より減少しました。
珪藻細胞数 St.4(0-5m): 6 cells/ml