


令和6年度 北灘 有害プランクトン調査 (6月13日調査) 徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (°C)	塩分	透明度 (m)	DO (mg/L)	細胞/mL						
							シャットネラ アンティーカ	シャットネラ マリーナ	シャットネラ 区分不能	シャットネラ オーバータ	シャットネラ グロボーサ	カレニア ミキモイ	コクロディニウム ポリクリコイデス
2	09:33	0-5			10.5		-	-	-	-	-	-	-
		0	20.99	31.36		8.1							
		1	20.73	31.37		8.1							
		5	20.59	31.36		8.1							
		10	19.54	31.45		8.1							
		15	19.10	31.49		7.5							
		20	19.16	31.53		7.5							
		B-1	18.54	31.64		7.0							
4	09:01	0-5			9.5		-	-	-	-	-	-	-
		0	-	-		-							
		1	21.40	31.33		8.1							
		5	21.23	31.33		8.0							
		10	19.91	31.40		8.0							
		15	19.33	31.44		8.0							
		20	18.95	31.55		7.5							
		25	18.45	31.79		7.2							
		30	17.86	31.93		6.5							
		35	17.54	32.01		5.7							
		40	17.49	32.02		5.6							
B-1	17.47	32.02	5.5										
5	10:11	0-5			8.7		-	-	-	-	-	-	-
		0	21.13	31.29		8.0							
		1	21.05	31.25		8.0							
		5	20.70	31.28		7.8							
		10	20.11	31.26		8.0							
		15	19.12	31.41		7.6							
		20	18.84	31.49		7.4							
		25	18.45	31.66		7.3							
		30	18.15	31.79		6.8							
B-1	17.62	31.87	5.8										



備考

- ・有害種は検出されませんでした。
- ・珪藻は、前回調査時から減少しました。  
珪藻細胞数 St.4(0-5m): 1 cells/ml