


令和6年度 北灘 環境調査（6月20日調査）徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (℃)	塩分	透明度 (m)	DO (mg/L)	細胞/mL						
							シャットネラ アンティーカ	シャットネラ マリーナ	シャットネラ 区分不能	シャットネラ オバータ	シャットネラ グロボーサ	カレニア ミキモトイ	コクロディニウム ポリクリコイデス
2	09:31	0-5			5.3		-	-	-	-	0.01	-	-
		0	22.30	30.11		8.1							
		1	22.03	30.33		8.1	-	-	0.03	-	-	-	-
		5	20.93	31.27		8.3	-	-	0.01	-	0.05	-	-
		10	20.02	31.47		8.2	-	-	0.01	-	0.02	-	-
		15	19.69	31.52		7.6							
		20	19.38	31.52		6.8							
		B-1	18.36	31.91		5.6	-	-	0.01	-	-	-	-
4	08:59	0-5			10.0		-	-	-	-	-	-	-
		0	22.03	30.56		7.8	-	-	0.08	-	0.01	-	-
		1	21.96	30.55		7.8	-	-	0.03	-	0.03	-	-
		5	21.23	31.21		7.7	-	-	-	-	-	-	-
		10	19.95	31.50		7.6	-	-	0.01	-	0.01	-	-
		15	19.58	31.54		7.1							
		20	19.24	31.63		6.9	-	-	0.01	-	-	-	-
		25	18.90	31.93		6.8							
		30	18.76	31.94		6.6	-	-	-	-	0.01	-	-
		35	18.21	32.00		5.7							
		40	17.51	32.08		4.5							
		B-1	17.52	32.07		4.5	-	-	0.01	-	-	-	-
5	10:03	0-5			9.5		-	-	0.02	-	0.03	-	-
		0	21.24	31.15		8.0							
		1	21.20	31.16		8.0	-	-	0.02	-	0.01	-	-
		5	21.05	31.28		8.0	-	-	0.01	-	-	-	-
		10	20.25	31.38		7.8	-	-	-	-	0.02	-	-
		15	19.62	31.50		7.4							
		20	19.27	31.62		7.0							
		25	19.01	31.82		6.9							
		30	18.91	31.88		6.8							
		B-1	17.96	31.96		4.9	-	-	-	-	-	-	-



備考

・有害種のシャットネラ属(区分不能、グロボーサ)が検出されましたが、ごく僅かでした。

・珪藻はキートセロス属主体で、前回調査時より増加しました。

珪藻細胞数 St.4(0-5m): 35 cells/ml