


St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (℃)	塩分	透明度 (m)	DO (mg/L)	細胞/mL							
							シャットネラ アンティーカ	シャットネラ マリーナ	シャットネラ 区分不能	シャットネラ オバータ	シャットネラ グロボーサ	カレニア ミキモトイ	コクロディニウム ポリクリコイデス	
2	09:47	0-5			7.6		-	-	-	-	0.05	-	-	
		0	21.78	30.75		8.9								
		1	21.61	30.94		8.9	-	-	0.03	-	0.01	-	-	
		5	21.31	31.11		8.5	-	-	0.06	-	0.04	-	-	
		10	20.93	31.26		8.0	-	-	0.03	-	0.08	-	-	
		15	20.71	31.36		7.2								
		20	20.48	31.44		6.6								
		B-1	20.33	31.47		6.1	-	-	-	-	-	-	-	
4	09:19	0-5			6.0		-	-	0.05	-	0.05	-	0.10	備 考 ・有害種のシャットネラ属(区分不能、オバータ、グロボーサ)が検出されましたが、ごく僅かでした。 ・有害種のコクロディニウム ポリクリコイデスが初認されましたが、ごく僅かでした。 ・珪藻はキートセロス属主体で、前回調査時より増加しました。 珪藻細胞数 St.4(0-5m):372 cells/ml
		0	21.53	30.94		8.8	-	-	0.03	-	0.02	-	0.02	
		1	21.32	30.91		8.8	-	-	0.02	-	0.03	-	-	
		5	20.99	31.20		8.4	-	-	0.08	-	0.04	-	-	
		10	20.53	31.31		7.2	-	-	0.02	0.01	0.02	-	-	
		15	20.47	31.35		7.0								
		20	20.43	31.39		6.9	-	-	-	-	-	-	-	
		25	20.16	31.57		6.6								
		30	19.75	31.94		6.6	-	-	-	-	-	-	-	
		35	18.65	31.97		5.2								
		40												
		B-1	18.61	31.98		5.0	-	-	-	-	-	-	-	
5	10:40	0-5			6.2		-	-	0.02	-	0.02	-	-	
		0	21.48	31.05		8.5								
		1	21.33	31.05		8.5	-	-	0.13	-	0.03	-	-	
		5	20.85	31.22		7.8	-	-	0.02	-	0.03	-	-	
		10	20.47	31.33		7.0	-	-	-	-	0.08	-	-	
		15	20.45	31.35		7.0								
		20	20.34	31.42		6.8								
		25	19.96	31.83		6.6								
		30	19.56	31.87		6.2								
		B-1	19.18	31.91		5.9	-	-	-	-	-	-	-	



- ・有害種のシャットネラ属(区分不能、オバータ、グロボーサ)が検出されましたが、ごく僅かでした。
- ・有害種のクロロディニウム ポリクリコイデスが初認されましたが、ごく僅かでした。
- ・珪藻はキートセロス属主体で、前回調査時より増加しました。
珪藻細胞数 St.4(0-5m):372 cells/ml