


令和6年度 播磨灘広域共同調査（7月16日調査） 徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (°C)	塩分	透明度 (m)	DO (mg/L)	細胞/mL							
							シャットネラ アンティーカ	シャットネラ マリナー	シャットネラ 区分不能	シャットネラ オバータ	シャットネラ グロボーサ	カレニア ミキモトイ	コクロディニウム ポリクリコイデス	
T4	08:18	0-5			11.3		-	-	0.01	-	0.01	0.01	-	播 磨 灘  ◎ T4 ◎ T1 ◎ St.4 大 栗 折 浦 田 野 淡路島 ・有害種のシャットネラ属(区分不能、オバータ)は前回調査時と同程度でした。 シャットネラ属 (3種合計 区分不能+オバータ) 最高細胞密度 1.23cells/mL (st.4 0-5m) ・有害種のシャットネラ グロボーサ が検出されましたが、低密度でした。 ・有害種のカレニア ミキモトイ及びコ クロディニウム ポリクリコイデスが検 出されましたが、低密度でした。 ・珪藻は前回調査時から減少しまし た。 珪藻細胞数 St.4(0-5m): 0cells/ml T4 (0-5m): 3cells/ml
		0	25.32	30.47		7.5								
		1	25.06	30.52		7.6	-	-	0.02	0.06	-	-	0.12	
		5	25.00	30.68		7.5	-	-	-	-	-	-	-	
		10	24.15	30.98		7.4	-	-	-	-	-	-	-	
		15	23.14	31.27		6.9								
		20	22.51	31.45		6.2	-	-	-	-	-	-	-	
		25	22.14	31.62		5.9								
		30	21.82	31.66		5.7	-	-	-	-	-	-	-	
		B-1	20.53	31.81		3.5	-	-	-	0.02	0.04	-	-	
T1	08:47	0-5			9.5		-	-	0.01	0.15	0.54	-	0.02	
		0	-	-		8.4								
		1	24.84	30.37		8.1	-	-	0.10	0.10	1.26	-	-	
		5	23.80	31.04		7.5	-	-	0.14	0.52	1.16	-	-	
		10	23.33	31.26		7.0	-	-	-	-	0.04	0.04	-	
		15	22.93	31.38		6.6								
		20	22.25	31.50		6.0								
		25	22.21	31.61		5.8								
		30	22.16	31.63		5.6								
		B-1	22.16	31.63		5.6	-	-	-	-	-	-	-	
St.4	09:01	0-5			7.0		-	-	0.53	0.70	1.90	-	-	
		0	24.92	30.00		8.8	-	-	-	-	0.08	-	-	
		1	24.75	30.17		8.8	-	-	0.01	0.02	0.13	-	-	
		5	23.09	30.84		7.2	-	-	0.35	0.74	2.02	-	0.07	
		10	22.35	31.05		5.9	-	-	0.31	0.24	0.93	-	-	
		15	22.83	31.37		6.2								
		20	22.26	31.50		6.1	-	-	0.02	0.05	0.08	-	-	
		25	22.25	31.67		6.0								
		30	22.19	31.71		5.7	-	-	-	-	-	-	-	
		35	21.22	31.69		5.1								
		B-1	19.81	31.92		2.9	-	-	0.02	0.01	0.09	0.01	-	