


令和6年度 北灘 環境調査（7月19日調査）徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (℃)	塩分	透明度 (m)	DO (mg/L)	細胞/mL						
							シャットネラ アンティーカ	シャットネラ マリナー	シャットネラ 区分不能	シャットネラ オーバータ	シャットネラ グロボーサ	カレニア ミキモトイ	コクロディニウム ポリクリコイデス
2	09:30	0-5			7.5		-	-	0.05	-	0.54	0.02	-
		0	26.01	30.27		8.4							
		1	25.43	30.37		8.5	-	-	-	-	0.13	0.02	-
		5	23.92	30.71		8.5	-	-	0.07	0.01	0.47	-	0.02
		10	22.98	30.86		7.3	-	-	0.10	0.09	0.22	0.04	-
		15	22.75	30.90		6.7							
		20	22.52	30.99		6.0							
		B-1	21.27	31.72		4.3	-	-	-	-	-	-	-
4	09:00	0-5			7.5		-	-	0.13	0.04	1.04	0.04	-
		0	26.03	30.50		8.7	-	-	0.06	0.07	2.05	0.07	0.02
		1	25.78	30.37		8.7	-	-	0.03	0.02	0.89	0.04	-
		5	23.38	30.77		8.2	-	-	0.05	0.05	0.25	-	0.04
		10	22.94	30.89		6.9	-	-	0.07	0.23	0.18	0.13	-
		15	22.65	30.99		6.1							
		20	22.49	31.07		5.6	-	-	0.07	0.04	0.03	-	-
		25	22.36	31.17		5.3							
		30	22.30	31.42		5.3	-	-	-	-	-	-	-
		35	21.64	31.80		5.1							
		40	20.37	31.88		3.6							
		B-1	20.37	31.89		3.6	-	-	0.01	0.01	0.05	-	-
5	10:07	0-5			7.3		-	-	0.23	0.11	0.26	0.03	0.04
		0	24.65	30.63		8.4							
		1	23.74	30.77		8.5	-	-	0.19	0.14	0.48	0.18	-
		5	23.09	30.85		7.2	-	-	0.03	0.01	0.09	-	-
		10	22.77	30.97		6.2	-	-	0.03	0.02	0.06	-	-
		15	22.70	31.02		6.0							
		20	22.63	31.07		5.8							
		25	22.61	31.19		5.7							
		30	22.59	31.37		5.8							
		B-1	20.40	31.86		3.5	-	-	-	0.01	0.03	-	-



備 考

・有害種のシャットネラ属(区分不能、オーバータ)、カレニア ミキモトイ、コクロディニウム ポリクリコイデスが検出されましたが、低密度でした。

・シャットネラ グロボーサが検出されましたが、低密度でした。

・珪藻は前回調査時と同程度でした。
珪藻細胞数 St.4(0-5m): 2 cells/ml