

令和6年度 北灘 有害プランクトン調査（7月25日調査）徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (℃)	塩分	透明度 (m)	DO (mg/L)	細胞/mL						
							シャットネラ アンティーカ	シャットネラ マリーナ	シャットネラ 区分不能	シャットネラ オバータ	シャットネラ グロボーサ	カレニア ミキモトイ	コクロディニウム ポリクリコイデス
2	09:18	0-5			6.0		-	-	0.02	-	0.12	-	0.04
		0	25.20	30.53		8.1							
		1	25.03	30.58		8.1	-	-	-	-	-	-	
		5	24.20	30.61		7.5	-	-	0.02	-	0.11	-	0.03
		10	23.71	30.65		6.6	-	-	0.02	-	0.09	0.12	0.08
		15	23.53	30.69		6.0							
		20	23.04	30.73		5.3							
		B-1	21.97	31.54		4.2	-	-	-	-	-	-	-
4	08:56	0-5			7.3		-	-	0.06	0.01	0.14	-	0.14
		0	25.35	30.41		8.2	-	-	0.01	-	0.02	-	-
		1	25.23	30.40		8.1	-	-	-	-	0.01	0.02	0.02
		5	24.42	30.48		7.6	-	-	0.07	-	0.15	-	0.10
		10	23.70	30.53		7.0	-	-	0.02	-	0.16	-	0.02
		15	23.25	30.69		5.9							
		20	22.87	30.97		5.4	-	-	-	-	0.01	-	-
		25	22.95	31.38		5.9							
		30	22.44	31.42		5.2	-	-	-	-	-	-	-
		35	22.00	31.52		4.6							
		40	21.26	31.63		3.7							
		B-1	21.26	31.63		3.7	-	-	-	-	-	-	-
5	09:47	0-5			7.6		-	-	0.02	-	0.08	0.01	0.15
		0	25.24	30.53		8.2							
		1	25.05	30.53		8.2	-	-	0.02	-	0.02	0.02	-
		5	24.36	30.56		8.0	-	-	0.04	-	0.12	0.01	0.13
		10	23.43	30.65		6.5	-	-	-	-	0.07	0.02	-
		15	22.90	30.85		5.4							
		20	22.96	31.16		6.5							
		25	22.91	31.42		5.9							
		30	22.72	31.44		5.6							
		B-1	21.36	31.61		3.8	-	-	-	-	0.01	-	-

備 考

・有害種のシャットネラ属(区分不能、オバータ)、カレニア ミキモトイ、コクロディニウム ポリクリコイデスが検出されましたが、低密度でした。

・珪藻はキートセロス属主体で、前回調査時より増加しました。
珪藻細胞数 St.4(0-5m):971 cells/ml