


令和6年度 北灘 有害プランクトン調査（8月1日調査）徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (℃)	塩分	透明度 (m)	DO (mg/L)	細胞/mL						
							シャットネラ アンティーカ	シャットネラ マリーナ	シャットネラ 区分不能	シャットネラ オバータ	シャットネラ グロボーサ	カレニア ミキモトイ	コクロディニウム ポリクリコイデス
2	08:41	0-5			7.6		-	-	0.18	-	0.01	-	2.61
		0	27.67	30.66		9.0							
		1	27.43	30.65		9.1	-	-	0.55	-	0.01	-	0.66
		5	26.87	30.67		8.4	-	-	0.07	-	0.02	-	1.01
		10	26.23	30.67		8.2	-	-	0.05	-	0.03	-	0.06
		15	25.68	30.70		7.3							
		20	24.15	30.73		5.6							
		B-1	22.78	31.44		4.2	-	-	0.03	-	-	-	-
4	08:17	0-5			7.9		-	-	0.08	-	0.03	-	-
		0	27.38	30.61		8.6	-	-	0.06	-	0.01	-	-
		1	27.26	30.61		8.6	-	-	0.16	-	-	-	-
		5	26.89	30.66		8.1	-	-	-	-	0.01	-	-
		10	26.44	30.69		7.8	-	-	0.12	0.03	0.12	-	0.18
		15	25.60	30.72		6.8							
		20	24.55	30.78		5.9	-	-	0.04	-	0.03	-	-
		25	23.72	31.08		5.4							
		30	23.34	31.37		5.7	-	-	-	-	0.04	-	-
		35	22.53	31.56		4.4							
		40	22.30	31.62		3.3							
		B-1	22.29	31.62		3.3	-	-	-	-	0.02	-	-
5	09:13	0-5			7.7		-	-	0.21	0.07	-	-	0.10
		0	27.90	30.70		8.1							
		1	27.66	30.66		8.1	-	-	0.01	-	-	0.01	-
		5	26.76	30.72		7.9	-	-	0.09	0.02	0.05	-	0.23
		10	26.42	30.72		8.0	-	-	0.06	-	0.02	-	-
		15	25.84	30.75		7.1							
		20	24.35	30.87		5.6							
		25	23.99	30.95		5.3							
		30	23.83	31.22		5.6							
		B-1	22.76	31.52		4.7	-	-	0.02	-	-	-	-



備 考

・有害種のシャットネラ属(区分不能、オバータ)、カレニア ミキモトイ、コクロディニウム ポリクリコイデスが検出されましたが低密度でした。

・シャットネラ グロボーサが検出されましたが、低密度でした。

・珪藻はキートセロス属主体で、前回調査時より増加しました。

珪藻細胞数

St.4(0-5m): 1,118 cells/ml