

令和6年度 播磨灘広域共同調査（8月5日調査） 徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (℃)	塩分	透明度 (m)	DO (mg/L)	細胞/mL									
							シャットネラ アンティーカ	シャットネラ マリーナ	シャットネラ 区分不能	シャットネラ オバータ	シャットネラ グロボーサ	カレニア ミキモトイ	コクロディニウム ポリクリコイデス	ディノフィシス アキュミナータ	ディノフィシス ロツンダータ	
T4	09:02	0-5			10.9		-	-	0.01	-	-	-	-	-	播 磨 灘 ◎ T4 ◎ T1 ◎ St.4 大 浦 栗 田 折 野 淡路島	
		0	29.08	30.78		7.5										
		1	28.86	30.78		7.5	-	-	0.02	-	-	-	-	-		
		5	28.34	30.84		7.8	-	-	0.02	-	-	-	0.20	-		-
		10	26.06	31.15		8.0	-	-	0.02	-	0.06	-	-	-		-
		15	25.24	31.34		6.9										
		20	24.93	31.64		6.5	-	-	0.02	-	-	-	-	-		-
		25	24.76	31.70		6.4										
		30	24.60	31.80		6.4	-	-	0.04	-	-	-	-	-		-
		B-1	24.49	31.86		6.3	-	-	-	-	-	-	-	-		-
T1	09:34	0-5			12.0		-	-	-	-	0.07	-	0.53	-	備考 ・有害種であるシャットネラ属(区分不能、オバータ)、コクロディニウム ポリクリコイデスが検出されましたが、低密度でした。 ・下痢性貝毒原因種であるディノフィシス属(アキュミナータ、ロツンダータ)が検出されましたが、ごく僅かでした。 ・珪藻は、T4はリゾソレニア属主体で前回調査時から減少し、St.4はキートセロス属主体で、前回調査時から増加しました。 珪藻細胞数 St.4(0-5m): 611cells/ml T4(0-5m): 37cells/ml	
		0	28.77	30.61		8.1										
		1	28.57	30.63		8.2	-	-	0.02	-	-	-	-	-		-
		5	26.81	30.90		8.7	-	-	-	-	0.06	-	0.56	-		0.02
		10	25.17	31.03		7.2	-	-	0.02	-	0.02	-	0.04	-		-
		15	24.86	31.45		6.5										
		20	24.61	31.64		6.1	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		25	24.50	31.81		6.2										
		30	24.46	31.84		6.2										
		B-1	24.46	31.83		6.2	-	-	-	-	0.04	-	0.08	-		-
St.4	09:54	0-5			9.0		-	-	0.01	0.01	0.11	-	0.26	-	-	
		0	28.05	30.71		9.0	-	-	0.16	-	0.01	-	-	-	-	
		1	27.71	30.68		9.2	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	
		5	26.14	30.68		9.3	-	-	0.01	0.01	0.10	-	0.16	-	-	
		10	25.47	30.74		6.5	-	-	0.07	-	0.14	-	0.06	-	-	
		15	25.03	30.83		5.8										
		20	24.44	30.90		4.2	-	-	0.01	-	0.02	-	-	-	-	
		25	23.92	31.37		4.8										
		30	24.35	31.69		5.5	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	
		35	23.74	31.69		4.5										
		B-1	22.19	31.69		2.5	-	-	0.01	-	0.03	-	-	-	-	