令和6年度　北灘　環境調査　（8月8日調査）　徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層（m）	水温（℃）	塩分	透明度（m）	DO（mg/L）	細胞/mL						
							シャットネラアンティーカ	シャットネラマリーナ	シャットネラ区分不能	シャットネラオバータ	シャットネラグロボーサ	カレニアミキモトイ	コクロディニウムポリクリコイデス
2	08:34	0-5			6.1		−	−	0.04	−	1.42	−	−
		0	26.52	30.67		8.1							
		1	25.90	30.65		8.9	−	−	0.02	−	0.20	−	−
		5	25.45	30.65		5.8	−	−	−	−	0.07	−	−
		10	25.08	30.71		3.3	−	−	0.02	−	−	−	−
		15	24.79	30.73		2.4							
		20	24.58	30.78		1.7							
		B-1	24.16	31.11		1.9	−	−	−	−	−	−	−
4	08:09	0-5			8.0		−	−	0.04	0.01	0.78	−	−
		0	27.52	30.86		7.9	−	−	0.02	−	0.01	0.01	−
		1	27.52	30.82		8.0	−	−	0.07	0.01	0.08	−	−
		5	26.14	30.71		7.0	−	−	0.05	0.02	0.58	−	−
		10	25.38	30.75		5.2	−	−	0.01	0.02	0.90	−	−
		15	25.18	30.82		4.6							
		20	24.91	30.90		4.1	−	−	0.07	−	0.21	−	−
		25	24.46	31.18		4.0							
		30	24.12	31.59		4.4	−	−	−	−	−	−	−
		35	23.86	31.72		4.4							
		40	23.62	31.72		3.9							
		B-1	23.61	31.72		3.9	−	−	−	−	−	−	−
5	09:01	0-5			7.8		−	−	0.03	−	0.22	−	−
		0	26.37	30.80		7.1							
		1	26.18	30.78		7.1	−	−	−	−	0.01	−	−
		5	25.97	30.79		7.5	−	−	−	0.04	0.78	−	0.20
		10	25.25	30.77		5.1	−	−	0.04	0.04	0.88	−	−
		15	25.05	30.82		4.6							
		20	24.84	30.84		4.0							
		25	24.44	31.59		5.2							
		30	24.38	31.77		5.7							
		B-1	23.90	31.72		4.7	−	−	0.01	−	−	−	−



備　考

・有害種のシャットネラ属（区分不能、オバータ）、カレニア ミキモトイ、コクロディニウム ポリクリコイデスが検出されましたが、低密度でした。

・珪藻はキートセロス属主体で、前回調査時より増加しました。
珪藻細胞数　St.4(0-5m)：860 cells/ml