


令和6年度 ウチノ海有害プランクトン調査（8月16日調査） 徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (℃)	塩分	透明度 (m)	DO (mg/L)	細胞/mL						
							シャットネラ アンディーカ	シャットネラ マリーナ	シャットネラ 区分不能	シャットネラ オバータ	シャットネラ グロボーサ	カレニア ミキモトイ	コクロディニウム ポリクリコイデス
1	08:03	0-5			5.8		-	-	-	0.05	0.06	-	-
		0	28.43	31.23		6.8							
		1	28.39	31.23		6.8							
		5	27.81	31.20		6.5							
		10	27.69	31.37		6.5							
		B-1	27.68	31.38		6.5							
2	08:08	0-5			8.0		-	-	-	-	0.01	-	-
		0	28.40	31.29		6.7							
		1	28.38	31.29		6.7							
		5	27.91	31.37		6.8							
		B-1	27.20	31.45		6.2							
3'	08:14	0-5			8.1		-	-	0.01	0.03	0.05	-	0.08
		0	28.42	31.30		6.9	-	-	0.03	-	0.01	-	-
		1	28.18	31.35		6.9	-	-	0.02	-	0.01	-	-
		5	27.69	31.42		6.8	-	-	-	-	0.03	-	-
		10	27.12	31.44		5.8							
		B-1	27.02	31.34		5.7	-	-	-	-	0.01	0.34	0.04
4	08:21	0-5			7.1		-	-	-	-	0.01	-	-
		0	27.96	31.34		6.6							
		1	27.89	31.34		6.6							
		5	27.61	31.41		6.4							
		10	27.06	31.44		5.4							
5	08:32	B-1	27.07	31.44	7.7	5.6							
		0-5					-	-	-	-	-	-	-
		0	28.32	31.29		6.8							
		1	28.30	31.29		6.8	-	-	0.03	0.03	0.05	0.01	0.10
		5	27.77	31.35		6.6	-	-	0.03	0.01	0.02	-	-
6	08:37	10	27.01	31.38	9.1	6.7	-	-	-	-	0.07	0.03	-
		B-1	26.75	31.40		6.3							
		0-5					-	-	0.01	0.03	0.06	-	-
		0	28.68	31.30		6.9							
		1	28.66	31.31		7.0							
		5	27.72	31.26		6.5							
		10	27.15	31.42		6.9							
		B-1	26.99	31.37		6.7							



備 考

・有害種のシャットネラ属(区分不能、オバータ)、カレニア ミキモトイ、コクロディニウム ポリクリコイデスが検出されましたが低密度でした。

・珪藻はキートセロス属主体で前回調査時から減少しました。
珪藻細胞密度 : 443 cells/ml (St.5 0-5m)