

令和6年度 ウチノ海環境調査（8月21日調査） 徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (℃)	塩分	透明度 (m)	DO (mg/L)	細胞/mL							
							シャットネラ アンティーカ	シャットネラ マリーナ	シャットネラ 区分不能	シャットネラ オバータ	シャットネラ グロボーサ	カレニア ミキモトイ	コクロディニウム ポリクリコイデス	
1	08:11	0-5			6.0		-	-	-	-	0.05	0.27	-	
		0	26.92	31.33		5.3								
		1	26.41	31.24		5.1								
		5	26.19	31.24		4.6								
		10	26.10	31.27		4.5								
		B-1	26.05	31.26		4.4								
2	08:16	0-5			4.8		-	-	0.09	-	-	-	-	
		0	27.54	31.37		5.9								
		1	27.06	31.43		5.9								
		5	26.80	31.62		5.3								
		B-1	26.70	31.64		5.5								
3'	08:22	0-5			6.0		-	-	-	-	0.06	0.01	0.02	
		0	27.97	31.35		6.4	-	-	-	-	-	-	-	
		1	27.78	31.35		6.5	-	-	-	-	-	-	-	
		5	27.02	31.55		5.7	-	-	-	-	-	-	-	
		10	26.81	31.63		5.7								
		B-1	26.54	31.68		5.6	-	-	-	0.01	-	-	-	
4	08:28	0-5			6.0		-	-	-	-	-	0.01	-	
		0	27.70	31.33		6.1	-	-	-	-	-	-	-	
		1	27.56	31.34		6.3	-	-	-	0.16	0.01	-	-	
		5	27.13	31.54		6.5								
		10	26.89	31.61		6.6								
		B-1	26.52	31.68		6.7								
5	08:38	0-5			6.4		-	-	-	-	-	0.01	-	
		0	27.87	31.35		6.5								
		1	27.58	31.36		6.3	-	-	0.01	-	0.01	-	0.06	
		5	27.20	31.55		5.6	-	-	-	-	-	-	-	
		10	26.71	31.66		5.4	-	-	-	0.01	0.01	0.09	-	
		B-1	26.67	31.65		5.5								
6	08:49	0-5			6.2		-	-	0.01	-	-	0.36	-	
		0	27.67	31.39		6.2								
		1	27.54	31.37		6.1								
		5	27.30	31.58		5.8								
		10	26.78	31.58		5.1								
		B-1	26.65	31.67		5.1								

備 考

・有害種のシャットネラ属(区分不能、オバータ)、カレニア ミキモトイ、コクロディニウム ポリクリコイデスが検出されましたが低密度でした。

・珪藻はキートセロス属主体で前回調査時から増加しました。
珪藻細胞密度 : 591 cells/ml (St.5 0-5m)