


令和6年度 北灘 有害プランクトン調査（8月26日調査）徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (℃)	塩分	透明度 (m)	DO (mg/L)	細胞/mL						
							シャットネラ アンティーカ	シャットネラ マリーナ	シャットネラ 区分不能	シャットネラ オバータ	シャットネラ グロボーサ	カレニア ミキモトイ	コクロディニウム ポリクリコイデス
2	10:12	0-5			11.2		-	-	-	-	0.01	-	-
		0	27.84	31.38		7.2							
		1	27.79	31.39		7.2	-	-	0.02	0.01	0.02	-	0.90
		5	27.25	31.41		6.9	-	-	-	-	-	-	-
		10	26.79	31.42		6.1	-	-	-	0.62	-	0.07	-
		15	26.38	31.46		5.1							
		20	26.01	31.51		4.4							
		B-1	24.64	31.86		2.8	-	-	-	0.01	-	0.01	-
4	09:48	0-5			10.4		-	-	-	-	-	-	-
		0	27.51	31.38		7.0	-	-	-	-	-	-	-
		1	27.49	31.37		6.9	-	-	-	0.09	-	-	0.04
		5	27.45	31.39		6.8	-	-	-	0.13	0.02	0.01	0.14
		10	26.95	31.40		6.3	-	-	0.09	-	0.05	0.01	-
		15	26.18	31.51		4.8							
		20	25.56	31.77		4.7	-	-	-	0.01	-	0.03	-
		25	25.24	31.89		4.6							
		30	24.64	31.96		4.1	-	-	-	0.02	0.01	0.01	-
		35	24.04	32.03		2.1							
		40											
		B-1	24.00	32.03		2.1	-	-	0.03	-	0.02	-	-
5	10:39	0-5			10.3		-	-	0.02	0.01	0.14	-	-
		0	27.95	31.43		7.2							
		1	27.93	31.38		7.2	-	-	-	-	-	-	-
		5	27.19	31.40		6.9	-	-	0.03	0.01	0.09	-	-
		10	26.83	31.40		6.3	-	-	-	0.08	-	0.04	-
		15	25.96	31.64		5.3							
		20	25.52	31.77		4.7							
		25	25.58	32.05		4.8							
		30	25.45	32.12		5.0							
		B-1	24.47	31.97		2.8	-	-	-	-	-	-	-



備 考

・有害種のシャットネラ属(区分不能、オバータ)、カレニア ミキモトイ、コクロディニウム ポリクリコイデスが検出されましたが低密度でした。

・珪藻は、前回調査時より減少しました。
珪藻細胞数 St.4(0-5m): 64 cells/ml