


令和6年度 ウチノ海有害プランクトン調査（8月27日調査） 徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (°C)	塩分	透明度 (m)	DO (mg/L)	細胞/mL						
							シャットネラ アンティーカ	シャットネラ マリーナ	シャットネラ 区分不能	シャットネラ オーバータ	シャットネラ グロボーサ	カレニア ミキモトイ	ココロディニウム ポリクリコイデス
1	08:09	0-5			7.9		-	-	-	0.01	-	-	-
		0	27.43	31.70		7.0							
		1	27.42	31.64		7.0							
		5	27.16	31.65		7.0							
		10	26.89	31.80		6.4							
		B-1	26.87	31.81	6.3								
2	08:15	0-5			6.0		-	-	0.03	-	0.04	-	-
		0	27.59	31.73		6.9							
		1	27.58	31.73		7.0							
		5	26.76	31.93		6.4							
		B-1	26.65	31.91		6.2							
3'	08:22	0-5			7.5		-	-	-	-	-	-	-
		0	27.51	31.71		7.1	-	-	-	0.04	0.02	-	-
		1	27.49	31.71		7.1	-	-	-	-	-	-	-
		5	26.77	31.91		6.5	-	-	-	0.09	0.02	-	0.08
		10	26.55	31.94		5.8							
		B-1	26.54	31.94	5.8	-	-	-	0.02	0.01	0.10	0.02	
4	08:29	0-5			7.0		-	-	0.04	0.01	0.01	-	-
		0	27.62	31.62		6.6							
		1	27.57	31.74		6.9							
		5	27.05	31.84		6.4							
		10	26.69	31.93		6.1							
		B-1	26.59	31.96	6.1								
5	08:36	0-5			7.2		-	-	-	0.03	0.03	-	-
		0	27.42	31.73		6.8							
		1	27.41	31.72		6.8	-	-	-	0.01	0.02	-	-
		5	26.75	31.86		6.8	-	-	0.02	0.01	0.04	-	-
		10	26.35	31.90		5.4	-	-	-	0.05	0.01	0.09	-
		B-1	26.31	31.88	5.3								
6	08:43	0-5			8.2		-	-	0.02	0.01	0.12	-	-
		0	27.49	31.65		6.8							
		1	27.08	31.72		7.0							
		5	26.55	31.84		6.7							
		10	26.27	31.88		5.2							
		B-1	26.18	31.87	4.4								



備考

- ・有害種のシャットネラ属(区分不能、オーバータ)、カレニア ミキモトイ、ココロディニウム ポリクリコイデスが検出されましたが低密度でした。
- ・珪藻はキートセロス属主体で前回調査時から増加しました。  
珪藻細胞密度 : 656 cells/ml (St.5 0-5m)