


令和6年度 北灘 有害プランクトン調査（9月12日調査）徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (℃)	塩分	透明度 (m)	DO (mg/L)	細胞/mL					
							シャットネラ 区分不能	シャットネラ オバータ	シャットネラ グロボーサ	カレニア ミキモトイ	コクロディニウム ポリクリコイデス	
2	07:50	0-5			12.2		0.02	1.3	0.01	-	-	
		0	27.78	31.38		7.2						
		1	27.75	31.38		7.2	-	-	-	-	-	
		5	27.52	31.39		7.4	0.05	0.3	0.12	-	-	
		10	27.33	31.42		7.0	0.14	5.7	0.15	0.7	-	
		15	27.29	31.43		6.6						
		20	27.10	31.49		5.7						
		B-1	26.81	31.52		4.4	0.03	0.7	0.06	0.7	-	
4	07:34	0-5			12.0		-	-	-	-	-	備 考 ・有害種のシャットネラ属(区分不能、オバータ)が前回調査時より減少しました。本種は、高密度化すると魚類を斃死させる恐れがあります。今後の動向にご注意ください。 シャットネラ属(3種合計 区分不能+オバータ) 最大細胞密度 15.0 cells/mL (St.5 20m) ・有害種のカレニア ミキモトイが前回調査時より増加し、最大で55.3 cells/mL (St.5 20m) 検出されました。本種は、高密度化すると、魚介類を斃死させる恐れがあります。今後の動向にご注意ください。 ・珪藻は、前回調査時より増加しました。 珪藻細胞数 St.4(0-5m): 21 cells/ml
		0	27.76	31.39		7.2	0.17	1.3	0.02	-	-	
		1	27.75	31.39		7.2	-	0.3	-	-	-	
		5	27.73	31.39		7.2	-	-	-	-	-	
		10	27.47	31.39		7.1	-	0.76	-	42.6	-	
		15	27.14	31.42		5.8						
		20	26.90	31.50		4.0	0.16	3.7	-	4.3	0.04	
		25	26.83	31.62		4.3						
		30	26.70	32.04		5.4	-	0.01	-	-	-	
		35	26.40	31.97		4.5						
		40	25.51	32.11		1.7						
		B-1	25.51	32.10		1.8	0.07	0.10	-	0.89	-	
5	08:14	0-5			12.0		0.16	6.0	0.03	2.3	-	
		0	27.79	31.39		7.4						
		1	27.77	31.40		7.4	0.09	0.3	0.02	-	-	
		5	27.59	31.41		7.2	0.18	3.7	0.16	1.7	-	
		10	27.49	31.42		6.9	0.11	3.0	0.13	2.7	-	
		15	27.15	31.47		5.8						
		20	27.05	31.51		5.0	-	15.0	-	55.3	-	
		25	27.02	31.50		4.9						
		30	26.81	31.75		4.6						
		B-1	26.11	32.04		3.5	0.07	0.08	-	3.3	-	