


令和6年度 北灘 有害プランクトン調査（9月17日調査） 徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (°C)	塩分	透明度 (m)	DO (mg/L)	細胞/mL					
							シャットネラ 区分不能	シャットネラ オバータ	シャットネラ グロボーサ	カレニア ミキモトイ	コクロディニウム ポリクリコイデス	
2	08:18	0-5			10.3		0.04	2.62	-	0.14	-	
		0	27.84	31.56		6.8						
		1	27.81	31.57		6.8	-	1.23	-	0.02	-	
		5	27.63	31.60		6.6	0.03	2.72	-	0.06	-	
		10	27.48	31.70		5.9	-	1.24	-	0.49	-	
		15	27.10	31.73		5.1						
		20	26.66	31.83		3.2						
		B-1	26.35	31.92		2.7	0.01	-	-	-	-	
4	07:58	0-5			10.3		0.05	2.29	-	0.05	-	備 考 ・有害種のシャットネラ属(区分不能、オバータ)が検出されましたが低密度でした。 シャットネラ属(区分不能+オバータ) 最大細胞密度 2.75 cells/mL (St.2 5m) ・有害種のカレニア ミキモトイが検出されましたが低密度でした。 最大細胞密度 0.49 cells/mL (St.2 10m) ・有害種のコクロディニウム ポリクリコイデスは検出されませんでした。 ・珪藻は、前回調査時より減少しました。 珪藻細胞数 St.4(0-5m): 5 cells/ml
		0	28.26	31.39		7.7	-	-	-	-	-	
		1	28.25	31.41		7.7	0.03	0.98	-	-	-	
		5	28.18	31.44		7.6	-	0.05	-	-	-	
		10	27.21	31.61		5.3	0.28	0.24	0.25	0.26	-	
		15	26.81	31.75		4.1						
		20	26.46	31.87		3.3	-	0.02	-	-	-	
		25	26.15	31.97		2.7						
		30	25.87	32.03		2.5	-	0.05	-	0.05	-	
		35	25.38	32.14		1.8						
		40	25.27	32.17		1.5						
		B-1	25.27	32.18		1.5	-	-	-	-	-	
5	08:44	0-5			10.9		-	-	-	-	-	
		0	28.28	31.56		7.5						
		1	28.25	31.55		7.5	0.29	0.22	0.08	0.09	-	
		5	27.62	31.68		6.5	0.51	0.45	0.25	-	-	
		10	27.18	31.76		5.5	0.02	-	-	0.02	-	
		15	27.10	31.82		5.3						
		20	26.98	31.84		5.1						
		25	26.70	31.87		4.0						
		30	26.37	31.97		3.3						
		B-1	25.31	32.25		1.6	-	0.02	-	0.08	-	