


令和6年度 北灘 環境調査（9月19日調査）徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (℃)	塩分	透明度 (m)	DO (mg/L)	細胞/mL					
							シャットネラ 区分不能	シャットネラ オバータ	シャットネラ グロボーサ	カレニア ミキモトイ	コクロディニウム ポリクリコイデス	
2	08:22	0-5			10.2		-	2.03	-	0.10	-	
		0	28.71	31.53		7.0						
		1	28.67	31.52		7.0	0.07	0.06	0.10	-	-	
		5	27.88	31.56		6.7	-	1.52	0.01	-	-	
		10	27.66	31.59		5.8	-	4.44	-	0.49	-	
		15	27.53	31.63		5.5						
		20	27.04	31.71		4.0						
		B-1	26.18	31.92		2.2	-	0.01	-	-	-	
4	08:00	0-5			10.9		-	1.46	-	0.13	-	備 考 ・有害種のシャットネラ属(区分不能、オバータ)が前回調査時より増加しました。 シャットネラ属(区分不能+オバータ) 最大細胞密度 4.44 cells/mL (St.2 10m) ・有害種のカレニア ミキモトイが検出されましたが、低密度でした 最大細胞密度 0.49 cells/mL (St.2 10m) ・有害種のコクロディニウム ポリクリコイデスは検出されませんでした。 ・珪藻は、前回調査時より増加しました。 珪藻細胞数 St.4(0-5m): 13 cells/ml
		0	28.21	31.50		7.0	0.12	0.31	0.05	0.01	-	
		1	28.15	31.50		7.0	-	0.86	-	-	-	
		5	27.82	31.51		6.7	-	2.09	-	0.03	-	
		10	27.63	31.55		6.0	-	-	-	0.01	-	
		15	27.23	31.70		4.8						
		20	26.91	31.92		4.5	-	0.77	-	0.05	-	
		25	26.60	32.02		4.0						
		30	26.36	32.02		3.5	0.01	0.08	0.01	-	-	
		35	25.97	32.03		2.3						
		40	25.67	32.07		1.6						
		B-1	25.67	32.07		1.6	-	-	-	-	-	
5	08:49	0-5			10.0		0.60	0.68	0.25	0.17	-	
		0	28.12	31.54		7.0						
		1	28.12	31.54		7.0	-	-	-	-	-	
		5	27.78	31.57		6.7	0.01	2.05	-	0.27	-	
		10	27.55	31.66		5.7	0.01	0.97	-	0.37	-	
		15	27.45	31.69		5.5						
		20	27.04	31.83		4.5						
		25	26.73	31.99		4.3						
		30	26.58	32.03		3.9						
		B-1	25.80	32.07		2.1	-	0.01	-	-	-	