

注 意 報

農技セ第5517号
令和6年9月27日

各関係機関長 殿

徳島県立農林水産総合技術支援センター
病虫害防除所長
(公印省略)

令和6年度農作物病虫害発生予察情報について

令和6年度農作物病虫害発生予察注意報第8号を発表したので送付します。

令和6年度病虫害発生予察注意報第8号

令和6年9月27日
徳 島 県

9月第4から5半旬のフェロモントラップ調査において、ハスモンヨトウ雄成虫の誘殺数が平年に比べてやや多く推移しています。今後、野菜類、花き類等で幼虫による被害の拡大が予想されますので、注意報を発令します。

現地圃場においては、本虫の発生状況を注視するとともに、適切な防除指導をお願いいたします。

作物名：野菜類、花き類

病虫害名：ハスモンヨトウ

1. 発生地域 県内全域

2. 発生時期 9月下旬～

3. 発生程度 多（前年よりやや多く、平年よりやや多い）

4. 注意報発令の根拠

- (1) フェロモントラップの定点（野菜圃場9地点）調査において、9月第4、5半旬の平均誘殺数が377頭、449頭と、平年(230頭、263頭)の約1.6倍、1.7倍となった（図1）。また、誘殺数のピークが平年に比べて約10日ほど早い傾向にある。
- (2) 高松地方气象台が9月26日に発表した1か月予報では、気温は平年より高く、特に期間の前半は、気温がかなり高くなると見込まれており、今後栽培圃場への飛来及び加害の増加が予想される。




図1 ハスモンヨトウ フェロモントラップ誘殺数の推移
(徳島市、石井町、阿波市、三好市、東みよし町の野菜圃場9地点平均)



図2 ハスモンヨトウの卵塊



図3 ハスモンヨトウふ化幼虫



図4 ハスモンヨトウ老齢幼虫

5. 防除法等

- (1) 若齢幼虫は成長すると広範囲に被害を及ぼすので、卵塊や群を発見したら、速やかに捕殺する(図2、3)。
- (2) 中・老齢幼虫に対しては薬剤の効果が劣るので、若齢幼虫期に薬剤防除する(図4、表1)。また、薬剤抵抗性発達の恐れがあるので、同一系統の薬剤の連用は避ける。
- (3) 防除については、徳島県植物防疫指針を参照するとともに、薬剤の使用に当たっては、必ず農薬ラベル記載事項を遵守する。

(<https://www.nouyaku-sys.com/noyaku/user/top/tokushima>)

- (4) 今後の発生動向については、徳島県立農林水産総合技術支援センターウェブページ内、病害虫防除所の各種データ・フェロモンのページを参考にする。

(<https://www.pref.tokushima.lg.jp/tafftsc/t-boujoshou/various-data/various-data/7240022/>)

表1 ハスモンヨトウに登録のある農薬の例(令和6年9月18日現在)

作物名	農薬名称 (商品名)	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	RAC コード
いちご	アニキ乳剤	2000倍	収穫前日まで	3回以内	6
	アフーム乳剤	2000倍	収穫前日まで	2回以内	6
	カスケード乳剤	4000倍	収穫前日まで	3回以内	15
	グレーシア乳剤	2000倍	収穫前日まで	2回以内	30
	コテツフロアブル	2000倍	収穫前日まで	2回以内	13
	ディアナSC	2500～5000倍	収穫前日まで	2回以内	5
	フェニックス顆粒水和剤	2000～4000倍	収穫前日まで	2回以内	28
	プレオフロアブル	1000倍	収穫前日まで	4回以内	UN
	プレバソンフロアブル5	2000倍	収穫前日まで	2回以内	28
	マッチ乳剤	3000倍	収穫前日まで	4回以内	15
	マトリックフロアブル	2000倍	収穫前日まで	3回以内	18
	ロムダンフロアブル	2000倍	収穫前日まで	2回以内	18
なす	アニキ乳剤	1000～2000倍	収穫前日まで	3回以内	6
	アフーム乳剤	2000倍	収穫前日まで	2回以内	6
	コテツフロアブル	2000倍	収穫前日まで	4回以内	13
	ディアナSC	2500～5000倍	収穫前日まで	2回以内	5
	プレオフロアブル	1000倍	収穫前日まで	4回以内	UN
	プレバソンフロアブル5	100倍(灌注) 2000倍	育苗期後半～定植当日 収穫前日まで	1回 2回以内	28
ブロッコリー	アクセルフロアブル	1000～2000倍	収穫前日まで	2回以内	22B
	アフーム乳剤	2000倍	収穫3日前まで	3回以内	6
	ヨーバルフロアブル	200倍(灌注) 2500～5000倍	育苗期後半～定植当日 収穫前日まで	1回 3回以内	28
	コテツフロアブル	2000倍	収穫3日前まで	2回以内	13
	ディアナSC	2500～5000倍	収穫前日まで	2回以内	5
	ファルコンエースフロアブル	2000倍	収穫3日前まで	2回以内	5 18
	ベネビアOD	2000～4000倍	収穫前日まで	3回以内	28
	トルネードエースDF	2000倍	収穫14日前まで	2回以内	22A
	ベリマークSC	400倍(灌注)	育苗期後半～定植当日	1回	28
カリフラワー	ベリマークSC	400倍(灌注)	育苗期後半～定植当日	1回	28
	プレバソンフロアブル5	100倍(灌注) 2000倍	育苗期後半～定植当日 収穫前日まで	1回 3回以内	28
	ディアナSC	2500～5000倍	収穫前日まで	2回以内	5
はなやさい類	グレーシア乳剤	2000～3000倍	収穫7日前まで	2回以内	30
	プロフレアSC	2000～4000倍	収穫前日まで	3回以内	30
レタス	ベリマークSC	400倍(灌注)	育苗期後半～定植当日	1回	28
	アフーム乳剤	1000～2000倍	収穫3日前まで	3回以内	6
	カスケード乳剤	4000倍	収穫3日前まで	3回以内	15
	グレーシア乳剤	2000～3000倍	収穫3日前まで	2回以内	30
	コテツフロアブル	2000倍	収穫前日まで	2回以内	13
	ジュリボフロアブル	200倍(灌注) 4000倍	育苗期後半～定植当日 収穫7日前まで	1回 2回以内	4A 28
	ノーモルト乳剤	2000倍	収穫3日前まで	2回以内	15
	フェニックス顆粒水和剤	2000～4000倍	収穫前日まで	2回以内	28
	プレオフロアブル	1000倍	収穫7日前まで	2回以内	UN
	プレバソンフロアブル5	2000倍 100倍(灌注)	収穫前日まで 育苗期後半～定植当日	3回以内 1回	28 28
	プロフレアSC※レタス類で登録	2000～4000倍	収穫前日まで	3回以内	30
	マトリックフロアブル	2000倍	収穫7日前まで	3回以内	18
花き類(きくを除く)	ロムダンフロアブル	1000倍	発生初期	5回以内	18