


令和6年度 ウチノ海有害プランクトン調査（9月27日調査） 徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (°C)	塩分	透明度 (m)	DO (mg/L)	細胞/mL							
							シャットネラ アンティーカ	シャットネラ マリーナ	シャットネラ 区分不能	シャットネラ オバータ	シャットネラ グロボーサ	カレニア ミキモトイ	ココロディニウム ポリクリコイデス	ヘテロカプサ サーキュラリスカーマ
1	08:01	0-5			10.2		-	-	-	0.04	0.02	0.15	-	28.3
		0	27.25	31.76		6.8								
		1	27.27	31.76		6.8								
		5	27.28	31.83		7.0								
		10	27.16	31.88		6.2								
		B-1	27.18	31.88	6.2									
2	08:06	0-5			7.9		-	-	0.08	-	0.07	0.30	-	191.7
		0	27.35	31.82		7.7								
		1	27.37	31.85		7.6								
		5	27.27	31.92		7.1								
		B-1	27.16	31.91		6.8								
3'	08:10	0-5			11.2		-	-	-	0.03	0.05	0.10	-	325.0
		0	27.30	31.80		7.1	-	-	-	0.01	0.02	0.01	0.01	293.3
		1	27.32	31.80		7.1	-	-	-	-	-	0.04	-	226.7
		5	27.16	31.90		7.2	-	-	-	0.03	0.07	0.7	-	405.0
		10	27.04	31.91		5.8								
		B-1	27.02	31.92	5.7	-	-	-	-	0.01	-	-	425.0	
4	08:16	0-5			12.5		-	-	-	0.01	0.01	0.7	-	171.7
		0	27.26	31.87		6.9								
		1	27.27	31.88		6.9								
		5	27.27	31.89		6.8								
		10	27.16	31.96		6.3								
		B-1	27.07	31.93	6.0									
5	08:20	0-5			11.3		-	-	-	-	-	5.3	-	1,345.0
		0	27.61	31.84		8.7								
		1	27.59	31.85		8.6	-	-	0.01	0.01	0.02	0.08	-	285.0
		2.5	27.40	31.87		7.9	-	-	-	-	-	0.3	-	388.3
		5	27.25	31.92		6.5	-	-	-	-	-	7.0	-	815.0
		10	27.03	31.97		4.5	-	-	-	-	-	1.3	-	541.7
		B-1	27.02	31.98	4.3									
6	08:27	0-5			11.9		-	-	-	-	0.01	4.3	-	1,428.3
		0	27.65	31.78		8.3								
		1	27.66	31.83		8.3								
		2.5	27.34	31.79		7.9	-	-	-	0.02	0.03	1.05	0.02	201.7
		5	27.09	31.95		6.0	-	-	-	-	-	5.3	-	1,525.0
		10	26.98	31.96		3.6	-	-	-	-	-	0.06	-	361.7
		B-1	26.94	31.97	3.1									



備考

- ・有害種のシャットネラ属(区分不能、オバータ)、カレニア ミキモトイ、ココロディニウム ポリクリコイデスが検出されましたが低密度でした。
- ・二枚貝を斃死させる恐れのある有害種のヘテロカプサ サーキュラリスカーマが高密度で検出され、茶色い着色も見られました。本種は、魚類や甲殻類に対しては無害とされています。今後の動向にご注意ください。
- ・珪藻は前回調査時から減少しました。
珪藻細胞密度 : 4 cells/ml (St.5 0-5m)