


令和6年度 ウチノ海環境調査（10月1日調査） 徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (℃)	塩分	透明度 (m)	DO (mg/L)						
							シャットネラ 区分不能	シャットネラ オバータ	カレニア ミキモトイ	コクロディニウム ポリクリコイデス	ヘテロカプサ サーキュラリスカーマ	
1	08:41	0-5			5.8		-	-	0.04	-	71.7	
		0	26.92	31.91		6.2						
		1	26.90	31.91		6.2						
		5	26.89	31.90		6.2						
		10										
		B-1	26.73	31.98		6.1						
2	08:37	0-5			5.1		-	-	0.02	-	843.3	
		0	26.91	31.91		6.5						
		1	26.85	31.92		6.7						
		3	26.84	32.01		6.5	-	-	0.01	-	286.7	
		5	26.76	32.08		6.0						
		B-1	26.73	32.10		6.1						
3'	08:33	0-5			8.0		-	-	0.05	-	93.7	備 考 ・有害種のシャットネラ オバータ、カレニア ミキモトイ検出されましたが低密度でした。 ・貝類を斃死させる恐れのある有害種のヘテロカプサ サーキュラリスカーマが高密度で検出され、茶色い着色も見られました。本種は、魚類や甲殻類に対しては無害とされています。今後の動向にご注意ください。 ・珪藻は前回調査時と同程度でした。 珪藻細胞密度 : 11 cells/ml (St.5 0-5m)
		0	26.82	31.89		7.8	-	-	0.02	-	53.7	
		1	26.81	31.89		7.8	-	-	-	-	58.3	
		5	26.80	32.03		6.7	-	0.01	-	-	62.0	
		10	26.60	32.15		6.2						
		B-1	26.62	32.14		6.2	-	-	0.02	-	4.0	
4	08:12	0-5			6.5		-	0.01	-	-	496.7	
		0	26.86	31.88		8.5						
		1	26.88	31.89		8.4						
		5	26.86	31.98		6.8						
		10	26.72	32.06		6.2						
		B-1	26.58	32.15		6.2						
5	08:17	0-5			7.5		-	-	-	-	1066.7	
		0	26.92	31.91		7.2						
		1	26.92	31.91		7.2	-	0.01	0.03	-	410.0	
		5	26.88	31.91		7.0	-	-	-	-	740.0	
		10	26.75	32.08		5.4	-	0.01	0.02	-	683.3	
		B-1	26.71	32.11		5.5						
6	08:25	0-5			6.0		-	-	-	-	800.0	
		0	26.94	31.90		7.8						
		1	26.94	31.91		7.7	-	-	0.01	-	260.0	
		5	26.93	31.92		7.6						
		6	26.92	31.97		7.0	-	-	-	-	1063.3	
		10	26.75	32.07		5.1						
		B-1	26.71	32.09		4.5						