


令和6年度 北灘 環境調査（10月2日調査）徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (°C)	塩分	透明度 (m)	DO (mg/L)	細胞/mL				
							シャットネラ 区分不能	シャットネラ オバータ	カレニア ミキモトイ	コクロディニウム ポリクリコイデス	ヘテロカプサ サーキュリスカーマ
2	08:37	0-5			14.0		-	-	0.01	-	0.04
		0	27.52	31.59		7.0					
		1	27.51	31.61		7.0	0.01	-	0.02	-	-
		5	27.49	31.61		6.9	-	-	-	-	0.01
		10	27.47	31.61		6.9	0.01	-	-	-	0.01
		15	27.42	31.62		6.7					
		20	27.39	31.63		6.7					
		B-1	26.61	32.21		5.1	0.01	-	-	-	-
4	08:14	0-5			13.9		0.03	-	-	-	-
		0	27.42	31.57		7.6	-	0.01	0.02	-	0.01
		1	27.41	31.56		7.6	0.01	-	0.01	-	-
		5	27.36	31.59		7.6	-	-	-	-	0.02
		10	27.34	31.60		7.7	0.01	-	-	-	-
		15	27.33	31.69		7.7					
		20	27.29	31.72		7.2	-	-	-	-	-
		25	27.25	31.74		6.9					
		30	26.88	32.07		6.0	-	-	-	-	-
		35	26.53	32.24		5.5					
		40	26.32	32.34		5.8					
		B-1	26.32	32.34		5.8	0.01	-	-	-	-
5	09:12	0-5			14.1		-	-	0.01	-	0.06
		0	27.44	31.59		7.6					
		1	27.42	31.59		7.6	-	0.01	0.01	-	0.07
		5	27.38	31.58		7.5	-	-	-	-	0.02
		10	27.27	31.72		7.2	-	-	-	-	-
		15	27.08	31.88		6.6					
		20	26.91	32.02		6.2					
		25	26.63	32.17		5.8					
		30	26.51	32.22		5.5					
		B-1	26.36	32.29		5.7	-	-	-	-	-



備 考

・有害種のシャットネラ属(区分不能、オバータ)、カレニア ミキモトイが検出されましたが低密度でした。

・貝類を斃死させる恐れのあるヘテロカプサ サーキュリスカーマが検出されましたが低密度でした。

・珪藻は、前回調査時より減少しました。
珪藻細胞数 St.4(0-5m): 2 cells/ml