


St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (℃)	塩分	透明度 (m)					
						シャットネラ 区分不能	シャットネラ オーバータ	カレニア ミキモトイ	ココロディニウム ポリクリコイデス	ヘテロカプサ サーキュリスカーマ
1	9:05	0-5			5.0	-	-	0.02	-	8.3
		0	25.27	25.60						
		1	25.63	32.03						
		5	25.63	32.08						
		10	25.62	32.07						
		B-1	25.62	32.08						
2	9:12	0-5			3.5	-	-	-	-	42.7
		0	26.74	30.07						
		1	26.88	31.94						
		5	26.82	32.05						
		B-1	26.72	32.15						
3'	9:21	0-5			3.3	-	-	0.01	-	115.0
		0	26.77	31.03						58.0
		1	26.81	31.90						106.7
		5	26.84	32.02						91.7
		10	26.72	32.14						
		B-1	26.69	32.14				0.01	-	83.3
4	9:28	0-5			5.2	-	-	-	-	223.3
		0	26.85	31.67						
		1	26.87	31.92						
		5	26.81	31.94						
		10	26.73	32.12				0.03	-	31.7
		B-1	26.60	32.20						
5	9:34	0-5			4.0	-	-	0.08	-	290.0
		0	25.24	31.15						
		1	25.45	32.15			0.01	0.02	-	79.0
		5	25.46	32.16				0.11	-	268.3
		10	25.45	32.16				0.02	-	213.3
		B-1	25.46	32.16						
6	9:40	0-5			3.2	-	-	0.36	-	713.3
		0	25.47	30.77				0.05	-	365.0
		1	25.56	32.13				0.29	-	315.0
		5	25.54	32.12				0.18	-	250.0
		10	25.48	32.12				0.12	-	260.0
		B-1	25.47	32.11						

北泊 島田島 撫佐 大毛島 堂浦 高島

備 考

- ・有害種のシャットネラ オーバータ、カレニア ミキモトイが検出されましたが低密度でした。
- ・貝類を斃死させる恐れのある有害種のヘテロカプサ サーキュリスカーマが高密度で検出されました。本種は、魚類や甲殻類に対しては無害とされています。今後の動向にご注意ください。
- ・珪藻は前回調査時と同程度でした。
珪藻細胞密度 : 5 cells/ml (St.5 0-5m)



備考

・有害種のシャットネラ オバータ、カレニア ミキ
モトイが検出されましたが低密度でした。

・貝類を斃死させる恐れのある有害種のヘテロカプサ サーキュリスカーマが高密度で検出されました。本種は、魚類や甲殻類に対しては無害とされています。今後の動向にご注意ください。

・珪藻は前回調査時と同程度でした。
珪藻細胞密度 : 5 cells/ml (St.5 0-5m)