


令和6年度 ウチノ海環境調査（10月16日調査） 徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (℃)	塩分	透明度 (m)	細胞/mL				
						シャットネラ 区分不能	シャットネラ オバータ	カレニア ミキモイ	コクロディニウム ポリクリコイデス	ヘテロカプサ サーキュリスカーマ
1	8:12	0-5			5.6	-	-	-	-	-
		0	25.27	32.17						
		1	25.33	32.30						
		5	25.33	32.31						
		10	25.32	32.31						
		B-1	25.31	32.31						
2	8:17	0-5			5.8	-	-	-	-	1.3
		0	25.07	31.35						
		1	25.23	32.22						
		5	25.30	32.27						
		B-1	25.31	32.30						
3'	8:22	0-5			5.9	0.01	-	-	-	1.7
		0	25.00	31.03		-	-	0.01	-	-
		1	25.16	32.19		-	-	-	-	-
		5	25.16	32.20		-	-	-	-	1.0
		10	25.19	32.24						
		B-1	25.20	32.31		-	-	-	-	-
4	8:29	0-5			8.0	-	-	0.01	-	3.0
		0	25.08	30.90						
		1	25.16	32.14						
		5	25.12	32.17						
		10	25.13	32.23						
5	8:35	0-5			8.8	-	-	-	-	0.61
		0	25.10	31.53						
		1	25.19	32.16		-	-	-	-	1.3
		5	25.19	32.16		-	-	-	-	-
		10	25.18	32.19		-	-	0.04	-	0.04
6	8:42	0-5			6.9	-	-	-	-	2.0
		0	24.89	30.67						
		1	25.04	32.10		-	-	-	-	-
		5	25.06	32.11		-	-	-	-	-
		10	25.12	32.16		-	-	-	-	-
		B-1	25.13	32.17						



備考

・有害種のシャットネラ属(区分不能、オバータ)、カレニアミキモイ検出されましたが低密度でした。

・貝類を斃死させる恐れのある有害種のヘテロカプササーキュリスカーマが検出されましたが低密度でした。

・珪藻は前回調査時と同程度でした。
珪藻細胞密度 : 10 cells/ml (St.5 0-5m)