


令和6年度 ウチノ海有害プランクトン調査（10月30日調査） 徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (℃)	塩分	透明度 (m)	細胞/L	細胞/mL			
						コシノディスカス ワイレシー	ユーカンピア ゾディアクス	シャットネラ オバータ	ヘテロカプサ サーキュリスカーマ	ディノフィシス カウデータ
1	8:29	0-5			5.2	130	-	-	-	-
		0	23.40	32.09						
		1	23.45	32.38						
		5	23.44	32.40						
		10	23.43	32.41						
		B-1	23.41	32.41						
2	8:34	0-5			5.1	110	-	-	-	-
		0	23.14	31.55						
		1	23.18	32.39						
		5	23.15	32.43						
		B-1	23.02	32.42						
3'	8:38	0-5			5.5	130	-	0.02	-	-
		0	23.04	31.68		110	-	0.03	-	0.02
		1	23.19	32.46		160	-	-	-	-
		5	23.20	32.50		30	-	0.01	-	-
		10	23.21	32.50						
		B-1	23.20	32.50		30	-	-	-	-
4	8:46	0-5			6.0	90	-	-	-	-
		0	23.08	31.52						
		1	23.22	32.46						
		5	23.25	32.50						
		10	23.25	32.51						
		B-1	23.25	32.51						
5	8:51	0-5			5.8	20	-	-	-	-
		0	22.97	31.49						
		1	23.03	32.40		100	-	-	-	0.01
		5	23.04	32.40		50	-	-	-	-
		10	23.09	32.43		100	-	-	-	-
		B-1	23.09	32.43						
6	9:01	0-5			6.0	60	-	0.03	-	-
		0	22.90	31.97						
		1	22.98	32.39		50	-	-	-	-
		5	22.97	32.40		80	-	-	-	-
		10	22.99	32.41		60	-	-	-	-
		B-1	22.99	32.41						



備 考

・有害種のシャットネラ オバータが検出されましたが低密度でした。

・有害種のヘテロカプサ サーキュリスカーマは検出されませんでした。

・下痢性貝毒原因種であるディノフィシス カウデータが検出されましたが低密度でした。

・藻類を色落ちさせる珪藻であるコシノディスカス ワイレシーが検出されましたが低密度でした。

・珪藻は非常に低密度でした。
珪藻細胞密度 : 7 cells/ml (St.5 0-5m)