


令和6年度 ウチノ海環境調査（11月6日調査） 徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (°C)	塩分	透明度 (m)	細胞/L		
						コシノディスカス ワイレシー	ユーカンピア ゾディアクス	シャットネラ オバータ
1	8:09	0-5			6.0	130	-	0.01
		0	22.55	32.04				
		1	22.65	32.31				
		5	22.67	32.32				
		10	22.63	32.33				
		B-1	22.64	32.33				
2	8:13	0-5			5.0	110	-	0.01
		0	22.30	32.17				
		1	22.44	32.33				
		5	22.33	32.43				
		B-1	22.31	32.43				
3'	8:17	0-5			4.5	130	-	-
		0	22.25	32.26		110	-	-
		1	22.32	32.41		160	-	-
		5	22.31	32.43		30	-	-
		10	22.31	32.42				
		B-1	22.30	32.42		30	-	0.02
4	8:23	0-5			5.0	90	-	-
		0	22.36	32.21				
		1	22.43	32.45				
		5	22.44	32.48				
		10	22.43	32.48				
		B-1	22.44	32.49				
5	8:29	0-5			4.5	20	-	0.01
		0	22.26	32.39				
		1	22.29	32.42		100	-	0.03
		5	22.29	32.42		50	-	0.01
		10	22.30	32.44		100	-	-
		B-1	22.29	32.44				
6	8:41	0-5			4.1	60	-	-
		0	22.14	32.29				
		1	22.17	32.33		50		
		5	22.18	32.34		80		
		10	22.19	32.35		60		
		B-1	22.19	32.35				



備考

・藻類を色落ちさせる珪藻であるコシノディスカスワイレシーが検出されましたが低密度でした。

・有害種のシャットネラオバータが検出されましたが低密度でした。

・珪藻は非常に低密度でした。
珪藻細胞密度 : 13 cells/ml (St.5 0-5m)