


令和6年度 ウチノ海環境調査（11月18日調査） 徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (℃)	塩分	透明度 (m)	DO (mg/L)	細胞/L	細胞/mL			
							コシノディスカス ワイレシー	ユーカンピア ゾディアクス	シャットネラ オーバータ	カレニア ミキモトイ	ヘテロカプサ サーキュリスカーマ
1	08:54	0-5			4.8		40	0.11	0.04	-	-
		0	21.19	32.24		6.8					
		1	21.19	32.22		6.8					
		5	21.18	32.23		6.8					
		10	21.19	32.24		6.8					
		B-1	21.19	32.25		6.8					
2	08:59	0-5			4.2		10	-	0.01	0.01	-
		0	20.85	31.87		6.9					
		1	20.89	31.85		6.9					
		5	20.85	32.04		6.9					
		B-1	20.82	32.05		6.9					
3'	09:04	0-5			5.9		20	-	0.03	-	-
		0	20.84	32.11		6.9	50	0.01	-	-	-
		1	20.87	32.11		7.0	250	0.09	-	-	-
		5	20.89	32.12		6.9	160	0.02	0.04	0.01	-
		10	20.89	32.12		6.9					
		B-1	20.89	32.13		6.9	110	0.07	0.01	-	-
4	09:11	0-5			4.6		40	-	-	-	-
		0	20.98	32.19		6.9					
		1	21.05	32.19		6.9					
		5	21.05	32.20		6.9					
		10	21.06	32.21		6.9					
		B-1	21.05	32.21		6.9					
5	09:17	0-5			8.7		180	-	0.05	-	0.01
		0	20.74	31.91		7.0					
		1	20.76	31.92		7.0	130	0.02	0.04	-	-
		5	20.78	31.95		7.0	60	-	-	-	-
		10	20.78	32.05		6.9	150	-	0.02	-	-
		B-1	20.77	32.05		6.9					
6	09:32	0-5			6.9		100	-	0.04	0.01	-
		0	20.80	31.98		6.9					
		1	20.82	32.02		6.9					
		5	20.81	32.02		6.9					
		10	20.76	32.05		6.9					
		B-1	20.75	32.05		6.9					



備 考

・有害種のシャットネラ オーバータ, カレニア ミキモトイ、ヘテロカプサ サーキュリスカーマが検出されましたが低密度でした。

・藻類を色落ちさせる珪藻であるコシノディスカス ワイレシーが検出されましたが低密度でした。

・珪藻はキートセロス属主体で前回調査時から増加しました。
珪藻細胞密度 : 48 cells/ml (St.5 0-5m)