


令和6年度 北灘 広域共同調査（11月27日調査）徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (℃)	塩分	透明度 (m)	DO (mg/L)	細胞/L		細胞/mL	
							コシノディスカス ワイレシー	コシノディスカス spp.	ユーカンピア ゾディアクス	シャットネラ オバータ
2	09:54	0-5			7.0		100	30	2.48	-
		0	19.14	31.82		7.4				
		1	19.17	31.83		7.4	40	40	2.33	0.01
		5	19.18	31.81		7.4	110	30	1.25	-
		10	19.18	31.79		7.4	80	40	1.71	0.01
		15	19.18	31.80		7.4				
		20	19.17	31.81		7.4				
		B-1	19.54	32.00		7.1	180	80	1.62	-
4	09:15	0-5			7.8		20	-	0.72	-
		0	19.18	31.83		7.5	30	40	0.32	-
		1	19.18	31.84		7.5	30	30	0.08	-
		5	19.18	31.88		7.5	60	20	1.22	-
		10	19.18	31.90		7.5	60	10	2.69	0.01
		15	19.18	31.89		7.5				
		20	19.19	31.91		7.5	90	20	1.57	0.02
		25	19.20	31.91		7.4				
		30	19.40	32.05		7.3	40	30	0.41	-
		35	19.53	32.17		7.2				
		40	19.60	32.23		7.2				
		B-1	19.63	32.27		7.2	140	40	1.44	-
5	10:34	0-5			5.0		50	-	0.80	0.04
		0	19.02	31.84		7.5				
		1	19.04	31.84		7.5	60	-	0.23	-
		5	19.04	31.82		7.5	70	-	0.20	0.03
		10	19.05	31.82		7.5	30	-	0.41	0.04
		15	19.05	31.83		7.5				
		20	19.06	31.83		7.5				
		25	19.08	31.85		7.5				
		30	19.12	31.87		7.5				
		B-1	19.22	31.96		7.5	20	10	0.29	0.03



備 考

・藻類を色落ちさせる珪藻について、コシノディスカス属は前回調査時より減少しましたが、ユーカンピア属は増加しました。

・有害種であるシャットネラ オバータが検出されましたが低密度でした。

・珪藻はキートセロス属主体で低密度で前回調査時より増加しました。
珪藻細胞数 St.4(0-5m): 333 cells/ml