


令和6年度 ウチノ海環境調査（12月4日調査）徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (℃)	塩分	透明度 (m)	DO (mg/L)	細胞/l		細胞/ml	
							コシノディスカス ワイレシー	コシノディスカス spp.	ユーカンピア ゾディアクス	シャットネラ オバータ
1	13:18	0-5			7.0		40	50	-	-
		0	17.89	32.33		7.6				
		1	17.79	32.34		7.6				
		5	17.68	32.31		7.6				
		10	17.50	32.28		7.6				
		B-1	17.49	32.27		7.6				
2	13:22	0-5			5.8		30	40	-	-
		0	17.48	32.22		7.7				
		1	17.48	32.27		7.7				
		5	17.36	32.28		7.8				
		B-1	17.32	32.27		7.7				
3'	13:27	0-5			6.0		30	10	-	-
		0	17.51	32.31		7.9	40	10	-	-
		1	17.55	32.31		7.9	130	40	-	-
		5	17.43	32.27		7.9	70	10	-	0.01
		10	17.36	32.25		7.8				
		B-1	17.34	32.25		7.8	90	30	-	-
4	13:35	0-5			6.5		10	40	-	-
		0	17.74	32.30		7.6				
		1	17.74	32.31		7.6				
		5	17.66	32.30		7.7				
		10	17.45	32.27		7.7				
		B-1	17.40	32.27		7.6				
5	13:41	0-5			5.8		20	-	-	-
		0	17.58	32.20		7.6				
		1	17.60	32.24		7.6	40	-	-	-
		5	17.46	32.22		7.7	-	-	-	-
		10	17.16	32.21		7.8	10	-	-	-
		B-1	17.15	32.21		7.8				
6	13:55	0-5			5.7		30	-	-	-
		0	17.29	32.21		7.9				
		1	17.31	32.25		7.9				
		5	17.27	32.23		7.8				
		10	17.16	32.21		7.9				
		B-1	17.09	32.20		7.8				



備 考

・有害種のシャットネラ オバータが検出されましたが低密度でした。

・藻類を色落ちさせる珪藻であるコシノディスカス属が検出されましたが低密度でした。

・珪藻は前回調査時から減少しました。
珪藻細胞密度: 0 cells/ml (St.5 0-5m)