


令和6年度 北灘 広域共同調査（12月4日調査）徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (°C)	塩分	透明度 (m)	DO (mg/L)	細胞/L		細胞/mL	
							コシノディスカス ワイレシー	コシノディスカス spp.	ユーカンピア ゾディアクス	シャットネラ オバータ
2		0-5								
		0								
		1								
		5								
		10								
		15								
		20								
		B-1								
4	10:22	0-5			10.0		80	10	-	-
		0	18.16	32.13			7.5			
		1	18.18	32.18			7.4	20	-	0.06
		5	18.18	32.21			7.4	60	10	-
		10	18.19	32.24			7.4	20	-	-
		15	18.19	32.25			7.4			
		20	18.19	32.26			7.4	60	10	0.01
		25	18.21	32.28			7.4			
		30	18.21	32.26			7.4	50	-	-
		35	18.27	32.28			7.3			
		40								
		B-1	18.28	32.29			7.3	70	20	-
5		0-5								
		0								
		1								
		5								
		10								
		15								
		20								
		25								
		30								
		B-1								
折野	9:50	0	16.90	31.37			80	20	-	-



備 考

- ・荒天のため、st.2及びst.5の調査は中止しました。
- ・有害種であるシャットネラ オバータが検出されましたが低密度でした。
- ・藻類を色落ちさせる珪藻について、コシノディスカス属及びユーカンピア属は前回調査時より減少しました。
- ・珪藻は前回調査時から減少しました。
珪藻細胞数 St.4(0-5m):0 cells/ml