

令和6年度 北灘 広域共同調査（12月4日調査）徳島県水産研究課												
St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (°C)	塩分	透明度 (m)	DO (mg/L)	細胞/L		細胞/mL			
							コシノディスカス ワイレシー	コシノディスカス spp.	ユーカンピア ゾディアクス	アレキサンドリウム sp.	ディノフィシス カウダータ	シャットネラ オバータ
2		0-5										
		0										
		1										
		5										
		10										
		15										
		20										
		B-1										
4	10:22	0-5			10.0	7.5	80	10	-	0.02	-	-
		0	18.16	32.13								
		1	18.18	32.18			20	-	0.06	0.09	-	-
		5	18.18	32.21			60	10	-	0.01	-	-
		10	18.19	32.24			20	-	-	-	0.01	-
		15	18.19	32.25								
		20	18.19	32.26			60	10	-	0.04	0.02	0.01
		25	18.21	32.28								
		30	18.21	32.26			50	-	-	-	-	-
		35	18.27	32.28								
		40										
		B-1	18.28	32.29			70	20	-	0.02	-	-
5		0-5										
		0										
		1										
		5										
		10										
		15										
		20										
		25										
		30										
		B-1										

備考

- ・荒天のため、st.2及びst.5の調査は中止しました。
- ・有害種であるシャットネラ オバータが検出されましたが低密度でした。
- ・麻痺性貝毒原因種を含むアレキサンドリウム属が検出されましたが低密度でした。
- ・藻類を色落ちさせる珪藻について、コシノディスカス属及びユーカンピア属は前回調査時より減少しました。
- ・珪藻は前回調査時から減少しました。
珪藻細胞数 St.4(0-5m):0 cells/ml