


令和6年度 北灘 広域共同調査（12月13日調査）徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (°C)	塩分	透明度 (m)	DO (mg/L)	細胞/L		細胞/mL				
							コシノディスカス ワイレシー	コシノディスカス spp.	ユーカンピア ゾディアクス	シャットネラ オバータ	アレキサンドリウム sp.	ディノフィシス カウダータ	
2	08:32	0-5			12.6		50	-	-	-	-	-	
		0	15.61	31.75		8.1							
		1	15.66	31.82		8.1	60	-	-	0.01	-	0.01	
		5	15.66	31.82		8.0	120	10	-	-	-	-	
		10	15.68	31.83		8.0	140	-	-	-	-	-	
		15	15.70	31.84		8.0							
		20	15.73	31.84		7.9							
		B-1	15.94	31.93		7.7	10	-	-	-	-	-	
4	08:07	0-5			13.1		90	-	-	-	-	-	備 考 ・藻類を色落ちさせる珪藻について、コシノディスカス属及びユーカンピア属は同程度でした。 ・有害種であるシャットネラ オバータが検出されましたが低密度でした。 ・麻痺性貝毒原因種を含むアレキサンドリウム属が検出されましたが低密度でした。 ・下痢性貝毒原因種のディノフィシス カウダータが検出されましたが低密度でした。 ・珪藻は前回調査時より増加しました。 珪藻細胞数 St.4(0-5m):41cells/ml
		0	15.98	31.94		7.9	10	-	-	-	-	-	
		1	15.98	31.94		7.9	80	-	-	-	-	-	
		5	15.98	32.04		7.9	20	-	-	0.01	0.02	-	
		10	15.98	32.05		7.8	90	-	-	-	0.02	-	
		15	15.99	32.07		7.8							
		20	15.99	32.05		7.8	80	-	-	-	-	-	
		25	15.99	32.02		7.8							
		30	16.06	32.13		7.8	60	-	-	-	-	-	
		35	16.56	32.43		7.5							
		40	16.59	32.44		7.5							
		B-1	16.59	32.44		7.5	60	10	0.21	-	-	-	
5	09:01	0-5			13.7		70	-	-	-	-	-	
		0	16.03	31.99		7.8							
		1	16.04	31.99		7.9	50	-	-	-	0.01	-	
		5	16.03	31.99		7.8	70	10	-	-	-	-	
		10	16.04	31.99		7.8	40	-	-	-	-	-	
		15	16.04	31.99		7.8							
		20	16.04	31.99		7.8							
		25	16.04	32.00		7.8							
		30	16.12	32.07		7.8							
		B-1	16.40	32.33		7.6	40	-	-	-	-	-	