令和6年度　ウチノ海環境調査 （2月5日調査） 徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層（m）	水温（℃）	塩分	透明度（m）	DO（mg/L）	細胞/mL	細胞/L	
							ユーカンピアゾディアクス	コシノディスカスワイレシー	コシノディスカスspp.
1	08:56	0-5			12.1		0.26	10	–
		0	9.08	32.20		9.3			
		1	9.10	32.25		9.3			
		5	9.08	32.30		9.2			
		10	9.01	32.33		9.2			
		B-1	9.03	32.32		9.2			
2	09:01	0-5			11.5		3.49	10	–
		0	8.86	32.31		9.3			
		1	8.89	32.33		9.3			
		5	8.89	32.32		9.3			
		B-1	8.71	32.28		9.3			
3’	09:07	0-5			11.7		2.50	–	–
		0	9.11	32.39		9.2	3.24	–	–
		1	9.12	32.40		9.3	1.56	–	–
		5	9.12	32.39		9.2	2.83	–	–
		10	9.09	32.39		9.3			
		B-1	9.09	32.39		9.3	4.03	–	–
4	09:13	0-5			13.2		0.56	–	–
		0	9.58	32.43		8.9			
		1	9.58	32.44		8.9			
		5	9.56	32.44		8.9			
		10	9.44	32.42		9.0			
		B-1	9.31	32.34		9.0			
5	09:20	0-5			11.8		0.63	–	–
		0	8.69	32.21		9.4			
		1	8.70	32.24		9.4	0.58	–	–
		5	8.70	32.25		9.4	1.61	10	–
		10	8.70	32.28		9.3	0.37	–	–
		B-1	8.71	32.28		9.3			
6	09:30	0-5			12.4		–	–	–
		0	8.68	32.17		9.2			
		1	8.70	32.23		9.2			
		5	8.71	32.23		9.2			
		10	8.71	32.23		9.2			
		B-1	8.71	32.24		9.2			



備　考

・藻類を色落ちさせる珪藻のコシノディスカス属及びユーカンピア属が検出されましたが、低密度でした。

・珪藻は前回調査時から減少しました。
　珪藻細胞密度　St.5(0-5m)：35 cells/ml