


令和6年度 北灘 広域共同調査（2月7日調査）徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (°C)	塩分	透明度 (m)	DO (mg/L)	細胞/L		細胞/mL			
							コシノディスカス ワイレシー	コシノディスカス spp.	ユーカンピア ゾディアクス	アレキサンドリウム sp.	ディノフィシス カウダータ	ディノフィシス フォルティ
2	09:23	0-5			12.1		-	-	0.14	-	-	-
		0	8.93	32.28		9.4	-	-	-	-	-	
		1	8.93	32.30		9.4	-	-	0.45	-	-	
		5	8.92	32.30		9.4	-	-	0.75	-	-	
		10	8.93	32.31		9.3	10	-	1.69	-	-	
		15	8.94	32.32		9.3	-	-	-	-	-	
		20	9.01	32.38		9.2	-	-	-	-	-	
		B-1	9.22	32.40		9.2	-	20	0.63	0.01	-	-
4	08:50	0-5			10.8		-	-	0.05	0.01	-	-
		0	9.53	32.45		9.2	-	-	0.93	-	-	
		1	9.53	32.45		9.2	-	-	2.08	-	-	
		5	9.54	32.51		9.2	-	-	0.60	-	-	
		10	9.53	32.50		9.1	-	10	0.14	-	0.01	
		15	9.53	32.49		9.1	-	10	1.07	-	-	
		25	9.53	32.50		9.1	-	-	-	-	-	
		30	9.52	32.50		9.1	-	-	0.38	-	0.01	
		35	9.51	32.50		9.1	-	-	-	-	-	
		40	9.50	32.51		9.1	-	-	-	-	-	
		B-1	9.50	32.51		9.1	-	-	0.89	-	-	-
		5	09:52	0-5				12.3		10	-	-
0	8.89			32.26	9.5	-	-		-	-	-	
1	8.90			32.25	9.4	-	-		-	-	-	
5	9.03			32.31	9.4	-	-		0.08	-	-	
10	9.18			32.37	9.3	10	-		0.88	-	0.01	
15	9.18			32.39	9.2	-	-		-	-	-	
20	9.28			32.42	9.2	-	-		-	-	-	
25	9.41			32.47	9.1	-	-		-	-	-	
30	9.51			32.48	9.1	-	-		-	-	-	
B-1	9.43			32.47	9.1	-	-		1.39	-	-	-



備考

- ・藻類を色落ちさせる珪藻について、コシノディスカス属は前回調査時より減少しましたが、ユーカンピア属は増加しました。
- ・麻痺性貝毒原因種を含むアレキサンドリウム属が検出されましたが、低密度でした。
- ・下痢性貝毒原因種であるディノフィシス属(カウダータ、フォルティ)が検出されましたが低密度でした。
- ・珪藻は前回調査時と同程度でした。
珪藻細胞数 St.4(0-5m): 1 cells/ml