


令和6年度 ウチノ海環境調査（2月20日調査）徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (℃)	塩分	透明度 (m)	DO (mg/L)	細胞/ml		細胞/L		
							アレキサンドリウム sp.	ユーカンピア ゾディアクス	コシノディスカス ワイレシー	コシノディスカス spp.	
1	08:02	0-5			10.3		-	1.47	-	-	
		0	7.98	32.28		9.8					
		1	7.99	32.30		9.8					
		5	7.99	32.34		9.8					
		10	7.99	32.40		9.9					
		B-1	8.00	32.40		9.9					
2	08:07	0-5			8.2		-	2.09	-	-	
		0	7.99	32.38		10.2					
		1	8.03	32.38		10.1					
		5	8.02	32.39		10.1					
		B-1	8.02	32.39		10.1					
3'	08:12	0-5			7.9		-	1.58	-	-	
		0	8.06	32.46		9.9	-	0.76	-	-	
		1	8.24	32.37		9.8	-	2.23	-	-	
		5	8.20	32.37		9.8	-	1.37	20	-	
		10	8.01	32.39		9.9					
		B-1	8.02	32.38		9.9	-	1.95	-	-	
4	08:20	0-5			10.0		-	0.14	-	-	備 考 ・藻類を色落ちさせる珪藻のコシノディスカス属及びユーカンピア属が検出されましたが、低密度でした。 ・麻痺性貝毒原因種を含むアレキサンドリウム属は検出されませんでした。 ・珪藻はキートセロス属主体で前回調査時から増加しました。 珪藻細胞密度 St.5(0-5m):310 cells/ml
		0	8.46	32.42		9.4					
		1	8.48	32.44		9.4					
		5	8.46	32.44		9.4					
		10	8.44	32.45		9.4					
		B-1	8.44	32.45		9.4					
5	08:26	0-5			9.6		-	1.29	-	-	
		0	7.90	32.23		9.9					
		1	7.90	32.33		9.9	-	1.92	-	-	
		5	7.91	32.33		10.0	-	1.84	-	-	
		10	7.92	32.33		10.0	-	0.23	-	-	
		B-1	7.91	32.33		10.0					
6	08:36	0-5			8.5		-	1.32	-	10	
		0	7.95	32.29		10.0					
		1	7.97	32.34		10.0					
		5	7.97	32.34		10.0					
		10	7.98	32.35		10.0					
		B-1	7.98	32.35		10.0					