

令和6年度発生予察月報（3月）

徳島県立農林水産総合技術支援センター
病虫害防除所

I. 気象概況 （徳島地方気象台観測値）

	平均気温(℃)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	本年	平年	差	本年	平年	差	本年	平年	差
上旬	8.6	8.7	- 0.1	28.0	29.0	- 1.0	43.0	55.2	- 12.2
中旬	9.6	9.9	- 0.3	26.5	25.2	+ 1.3	31.2	60.7	- 29.5
下旬	-	11.1	-	-	33.6	-	-	63.9	-

※本年中旬の値は3/11～3/18のデータで計算しています(3/19～20のデータは入っていません)。

II. 病虫害の発生状況

[果 樹]

温州ミカン

徳島市、勝浦町、佐那河内村調査: 3/13

病虫害名	発生程度別圃場数						発生圃場率(%)	発生程度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
そうか病	4	4	0	0	0	8	50.0	12.5	旧葉の発病度: 1.0
ミカンハダニ	5	3	0	0	0	8	37.5	9.4	旧葉の寄生率: 0.9

スダチ

徳島市、神山町、佐那河内村、勝浦町調査: 3/13

病虫害名	発生程度別圃場数						発生圃場率(%)	発生程度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
かいよう病	0	5	3	0	0	8	100.0	34.4	旧葉の発病程度: 9.6
そうか病	5	3	0	0	0	8	37.5	9.4	旧葉の発病度: 0.1
ミカンハダニ	4	4	0	0	0	8	50.0	12.5	旧葉の寄生率: 1.9

ナシ

鳴門市、松茂町調査: 3/17

病虫害名	発生程度別圃場数						発生圃場率(%)	発生程度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
黒星病	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	芽基部発病芽率(%): 0.0
輪紋病	7	1	0	0	0	8	12.5	3.1	越冬いぼ数: 0.0

カキ

上板町、つるぎ町、東みよし町調査: 3/17

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
炭 疽 病	5	1	0	0	0	6	16.7	4.2	越 冬 病 枝 率 (%) : 0.3
フジ ^ノ コナカイガ ^ノ ラムシ	6	0	0	0	0	6	0.0	0.0	寄 生 結 果 母 枝 率 (%) : 0.0

[野 菜]

冬春トマト

阿波市調査: 3/14、17

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
疫 病	7	0	0	0	0	7	0	0	発 病 度 : 0
灰 色 か び 病	7	0	0	0	0	7	0	0	発 病 葉 率 (%) : 0
灰 色 か び 病	7	0	0	0	0	7	0	0	発 病 果 率 (%) : 0
葉 か び 病	7	0	0	0	0	7	0	0	発 病 度 : 0
タハ ^ノ ココナシ ^ノ ラムシ	4	3	0	0	0	7	42.9	10.7	1 葉当たり 寄生成虫数(頭): 1.2
タハ ^ノ ココナシ ^ノ ラムシ	4	2	0	0	1	7	42.9	21.4	寄 生 葉 率 (%) : 13.9
オンシツコナシ ^ノ ラムシ	7	0	0	0	0	7	0	0	1 葉当たり 寄生成虫数(頭): 0
オンシツコナシ ^ノ ラムシ	7	0	0	0	0	7	0	0	寄 生 葉 率 (%) : 0

冬春ナス

吉野川市、阿波市調査: 3/14、17

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
灰 色 か び 病	4	1	0	0	0	5	20.0	5.0	発 病 葉 率 (%) : 0.8
〃	4	0	1	0	0	5	20.0	10.0	発 病 果 率 (%) : 1.2
う ど ん こ 病	3	2	0	0	0	5	40.0	10.0	発 病 葉 率 (%) : 0.4
〃	3	2	0	0	0	5	40.0	10.0	発 病 度 : 0.1
す す か び 病	1	4	0	0	0	5	80.0	20.0	発 病 葉 率 (%) : 1.8
〃	1	4	0	0	0	5	80.0	20.0	発 病 度 : 0.5
アブラムシ類	5	0	0	0	0	5	0.0	0.0	寄 生 葉 率 (%) : 0.0
〃	5	0	0	0	0	5	0.0	0.0	1葉当たり 寄生成虫数(頭): 0.0
アザミウマ類	3	2	0	0	0	5	40.0	10.0	寄 生 葉 率 (%) : 1.8
〃	5	0	0	0	0	5	0.0	0.0	被 害 果 率 (%) : 0.0
オンシツコナジラムシ	5	0	0	0	0	5	0.0	0.0	成 虫 寄 生 葉 率 (%) : 0.0
タバココナジラムシ	0	2	1	2	0	5	100.0	50.0	成 虫 寄 生 葉 率 (%) : 34.2
ハ ダ ニ 類	5	0	0	0	0	5	0.0	0.0	寄 生 葉 率 (%) : 0.0
黒 枯 病	5	0	0	0	0	5	0.0	0.0	発 病 度 : 0.0

冬春キュウリ

小松島市、阿南市、海陽町調査: 3/12

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
べ と 病	5	2	2	0	0	9	44.4	16.7	発 病 葉 率 (%) : 13.4
う ど ん こ 病	7	1	1	0	0	9	22.2	8.3	発 病 葉 率 (%) : 6.2
褐 斑 病	7	1	1	0	0	9	22.2	8.3	発 病 葉 率 (%) : 1.1
〃	7	1	1	0	0	9	22.2	8.3	発 病 度 : 1.1
灰 色 か び 病	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	寄 生 果 率 (%) : 0.0
アブラムシ類	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	寄 生 葉 率 (%) : 0.0
〃	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	1 葉あたり生息数(頭): 0.7
アザミウマ類	4	1	1	2	1	9	55.6	36.1	寄 生 葉 率 (%) : 12.8
〃	8	0	1	0	0	9	11.1	5.6	被 害 果 率 (%) : 0.7
タバココナジラミ	5	4	0	0	0	9	44.4	11.1	寄 生 葉 率 (%) : 1.4
疫病(立枯性)	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	発 病 株 率 (%) : 0.0
斑 点 細 菌 病	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	発 病 葉 率 (%) : 0.0
つ る 枯 病	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	発 病 株 率 (%) : 0.0
菌 核 病	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	発 病 株 率 (%) : 0.0

ブロッコリー・カブラー

徳島市、阿波市調査: 3/13

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
コ ナ ガ	16	0	0	0	0	16	0.0	0.0	10 株当たり 幼虫・蛹数(頭): 0.0
アブラムシ類	14	2	0	0	0	16	12.5	3.1	寄 生 株 率 (%) : 0.6
黒 す す 病	12	4	0	0	0	16	25.0	6.3	発 病 度 : 0.3

秋冬ネギ

徳島市調査: 3/13

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
さ び 病	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	発 病 株 率 (%) : 0.0
べ と 病	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	発 病 株 率 (%) : 0.0

春夏ニンジン

阿南市、藍住町、板野町、上板町、石井町、吉野川市調査: 3/14

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
黒 葉 枯 病	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	発 病 度 : 0.0
アブラムシ類	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	寄 生 株 率 (%) : 0.0

冬春ホウレンソウ

徳島市、石井町調査： 3/13、17									
病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
アブラムシ類	10	1	0	0	0	11	9.1	2.3	1 株当たり 寄生虫数(頭)： 0.0
べ と 病	11	0	0	0	0	11	0.0	0.0	発 病 度 ： 0.0

冬春イチゴ

徳島市、小松島市、阿南市、佐那河内村、阿波市調査： 3/14、17									
病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目および発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
灰 色 か び 病	10	1	0	0	0	11	9.1	2.3	発 病 果 率 (%)： 0.3
う ど ん こ 病	10	1	0	0	0	11	9.1	2.3	発 病 葉 率 (%)： 0.1
〃	10	1	0	0	0	11	9.1	2.3	発 病 果 率 (%)： 0.2
アブラムシ類	9	2	0	0	0	11	18.2	4.5	寄 生 株 率 (%)： 1.5
ハ ダ ニ 類	3	8	0	0	0	11	72.7	18.2	寄 生 株 率 (%)： 6.7
〃	3	7	1	0	0	11	72.7	20.5	寄 生 葉 率 (%)： 7.9
アザミウマ類	5	1	3	1	0	10	50.0	25.0	寄 生 花 率 (%)： 2.4

注1) 発生程度指数*は以下の式より 求めている。

$$\text{発生程度指数} = \frac{(\text{少} \times 1 + \text{中} \times 2 + \text{多} \times 3 + \text{甚} \times 4)}{\text{調査圃場数} \times 4} \times 100$$