


令和6年度 北灘 環境調査（3月21日調査）徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (℃)	塩分	透明度 (m)	DO (mg/L)	細胞/L		細胞/mL		
							コシノディスカス ワイレシー	コシノディスカス spp.	ユーカンピア ゾディアクス	ノクチルカ シンチランス	
2	08:28	0-5			14.2		-	-	-	0.10	
		0	9.32	32.31		9.7					
		1	9.31	32.32		9.7	-	-	-	0.01	
		5	9.23	32.32		9.6	-	-	-	0.05	
		10	9.05	32.34		9.6	-	-	-	0.13	
		15	8.98	32.35		9.6					
		20	8.98	32.37		9.4					
		B-1	9.02	32.40		9.3	-	-	-	0.05	
4	08:04	0-5			11.6		-	-	-	0.04	
		0	8.99	32.31		9.9	-	-	-	0.11	
		1	9.00	32.30		9.8	-	-	-	0.18	
		5	9.04	32.34		9.8	-	-	-	0.04	
		10	8.92	32.37		9.6	-	-	-	0.01	
		15	9.01	32.46		9.5					
		20	9.02	32.48		9.4	-	-	-	0.02	
		25	9.00	32.49		9.3					
		30	9.01	32.49		9.3	-	-	-	-	
		35	9.01	32.50		9.3					
		40									
		B-1	9.01	32.50		9.3	-	-	-	0.01	
5	08:57	0-5			13.7		-	-	-	0.04	備 考 ・藻類を色落ちさせる珪藻について、コシノディスカス属及びユーカンピア属は検出されませんでした。 ・ノクチルカ シンチランス(通称:ヤコウチュウ)が検出されましたが、低密度でした。 ・珪藻は前回調査時から若干増加しましたが、低密度でした。 珪藻細胞数 St.4(0-5m): 22cells/ml
		0	9.22	32.34		9.7					
		1	9.23	32.34		9.7	-	-	-	0.27	
		5	9.16	32.37		9.6	-	-	-	0.02	
		10	9.07	32.36		9.6	-	-	-	0.04	
		15	9.06	32.37		9.5					
		20	9.02	32.40		9.5					
		25	9.01	32.42		9.4					
		30	8.98	32.44		9.4					
		B-1	9.04	32.47		9.3	-	-	-	-	